42°С), грязьові аплікації місцево на область правого підребер'я тривалістю процедури 15-20 хв. через день, курс 9-10 процедур.
- 30 осіб з захворюваннями опорно-рухового апарату (ОРА), для них застосовували розігріті до 44єС аплікації на уражену ділянку тривалістю процедури 15-20 хв., курс 9-10 процедур.

У процесі використання "ПЕЛОСИДУ" в лікуванні даної групи пацієнтів ми спостерігали швидкий терапевтичний ефект:
- зник болевий синдром та покращилося травлення у пацієнтів із захворюваннями ГБС;
- збільшився об'єм активних і пасивних рухів у суглобах, зменшилася спастичність м'язів у пацієнтів із захворюванням ОРА.

Ускладнень та алергічних реакцій не відмічалось.

Лікувальний ефект "ПЕЛОСИДУ" обумовлений рядом факторів:
- фізико-хімічний (коллоїдно-хімічний) реалізується за рахунок високих адсорбційних можливостей, що дозволяє здійснювати направлений масообмін через шкірні покриви, видаляти або навпаки доставляти ті чи інші речовини в систему крово- та лімфообігу, в різні тканини організму і суглоби;
- хімічний — за рахунок наявного специфічного набору речовин і мікроелементів у відповідних концентраціях, що забезпечує цільову зміну метаболічних та інших функціонально важливих процесів ендокринної регуляції.
- біологічний — за рахунок унікальної біологічно-активної органічної складової, якій притаманні свої особливості лікувальної дії.

Вказані фактори взаємодоповнюють один одного і в комплексі обумовлюють посилену дію кожного з них.

Застосування "ПЕЛОСИДУ" у відновлювальному лікуванні хворих з захворюваннями опорно-рухового апарату та гепатобіліарної системи мало високі показники ефективності даного методу в комплексі санаторно-курортного лікування.

УДК 615.37+615.015.32

- В.Н. Пащенко, к.мед.н, руководитель научно-информационного отдела
- *Украинская академия биологической медицины, г. Киев*

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА АНТИГОМОТОКСИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Гомотоксикология придерживается базисных принципов, на которых основывается доказательная медицина, а именно: приоритетность клинической оценки эффективности лечения, необходимость тщательного наблюдения за динамикой развития клинических проявлений, изучение осложнений и изменения течения болезни, оценка отдаленных результатов, подбор препарата с учетом индивидуальных особенностей.

При регистрации в Германии антигомотоксические препараты проходят все 4 фазы клинических испытаний. При регистрации антигомотоксических препаратов в Украине предоставляются данные немецких исследований. Пострегистрационные клинические исследования проводятся в Германии, Украине, а также других странах.

Работы по изучению эффективности антигомотоксических препаратов выполняются в соответствиями с требованиями доказательной медицины.

Состоянием на 2009 год, эффективность антигомотоксической терапии подтверждена результатами 21 рандомизированного плацебо-контролируемого исследования, 64 рандомизированных сравнительных исследований, 320 нерандомизированных контролируемых клинических исследований. По антигомотоксическим препаратам в Украине защищено 8 докторских и 39 кандидатских диссертаций, изданы 21 методические рекомендации МОЗ Украины. С включением антигомотоксических препаратов зарегистрировано 38 патентов на изобретение в Украине и 4 в Молдове.

Наличие современной доказательной базы по эффективности антигомотоксической терапии дает возможность широкому внедрению ее в практическую деятельность врачей любой специальности.

© В.Н. Пащенко, 2010