

УДК 512.643.8

**О. А. Тилищак, Н. В. Юрченко** (Ужгородский нац. ун-т),  
**Р. Ф. Цімболинець** (Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка)

**НЕРОЗКЛАДНІСТЬ ОДНІЄЇ МАТРИЦІ ДОВІЛЬНОГО ПОРЯДКУ НАД ЛОКАЛЬНИМ КІЛЬЦЕМ**

It has been shown that the product of the permutation matrix of the cycle of length  $n$  and the diagonal matrix  $\text{diag}[1, \dots, 1, t, t]$  over a commutative local principle ideal ring, the Jacobson radical of which is generated by the element  $t \neq 0$ , is indecomposable.

Показано нерозкладність добутку підстановочної матриці циклу довжини  $n$  та діагональної матриці  $\text{diag}[1, \dots, 1, t, t]$  над комутативним локальним кільцем головних ідеалів, радикал Джекобсона якого породжується елементом  $t \neq 0$ .

**1. Вступ.** Задача класифікації всіх, з точністю до подібності, квадратних матриць над комутативним кільцем (що не є полем) досить складна; в більшості випадків вона “нерозв’язна” (наприклад, як над кільцем класів лишків, що розглядалася В. М. Бондаренком [1]). У таких випадках важливим є вивчення незвідних та нерозкладних матриць.

З результатів досліджень П. М. Гудивка та другого автора [2] випливає наступне твердження.

**Теорема 1.** *Нехай  $K$  – комутативне локальне кільце, радикал Джекобсона якого  $\text{Rad } K = tK, t \neq 0$ . Матриці*

$$M(t, 1, n) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & t \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M(t, n - 1, n) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & t \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & t & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & t & 0 \end{pmatrix}$$

порядку  $n > 1$  незвідні над кільцем  $K$ .

У роботі [3] для досить широкого класу мономіальних матриць над локальними кільцями з’ясовано, коли мономіальні матриці є звідними. За гіпотезою В. М. Бондаренка матриця

$$M(t, m, n) = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \overbrace{0 \dots 0}^m & t \\ 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & t & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & t & 0 \end{pmatrix}, \quad (1)$$

порядку  $n$  над комутативним локальним кільцем  $K, \text{Rad } K = tK, t \neq 0, t^2 = 0, 1 \leq m \leq n$ , незвідна тільки при  $m = 1$ , та  $n - 1$  (див. вище теорему 1) та для

$m = 2$  при непарному  $n$ . У останньому випадку залишалось відкритим навіть питання нерозкладності цієї матриці. Зауважимо, що для  $(m, n) > 1$  (а значить і для  $m = 2, n$  — парне) в [3] показано, що (1) звідна.

У цій статті ми доводимо нерозкладність матриці  $M(t, 2, n)$  для довільного  $n > 2$ .

## 2. Нерозкладність матриці $M(t, 2, n)$ .

**Теорема 2.** *Нехай  $K$  — комутативне локальне кільце,  $\text{Rad } K = tK, t \neq 0$ . Матриця  $M(t, 2, n)$  порядку  $n > 2$  є нерозкладною над  $K$ .*

*Доведення.* Розглянемо матрицю

$$M = M(t, 2, n) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & t \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & t & 0 \end{pmatrix}$$

і всі такі матриці  $C = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ , що

$$MC = CM \tag{2}$$

або в розгорнутому вигляді

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & t \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & t & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n-2} & c_{1n-1} & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n-2} & c_{2n-1} & c_{2n} \\ c_{31} & c_{32} & \dots & c_{3n-2} & c_{3n-1} & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n-11} & c_{n-12} & \dots & c_{n-1n-2} & c_{n-1n-1} & c_{n-1n} \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn-2} & c_{nn-1} & c_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n-2} & c_{1n-1} & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n-2} & c_{2n-1} & c_{2n} \\ c_{31} & c_{32} & \dots & c_{3n-2} & c_{3n-1} & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n-11} & c_{n-12} & \dots & c_{n-1n-2} & c_{n-1n-1} & c_{n-1n} \\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn-2} & c_{nn-1} & c_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & t \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & t & 0 \end{pmatrix}.$$

Тоді

$$\begin{pmatrix} tc_{n1} & tc_{n2} & \dots & tc_{nn-2} & tc_{nn-1} & tc_{nn} \\ c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n-2} & c_{1n-1} & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n-2} & c_{2n-1} & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n-21} & c_{n-22} & \dots & c_{n-2n-2} & c_{n-2n-1} & c_{n-2n} \\ tc_{n-11} & tc_{n-12} & \dots & tc_{n-1n-2} & tc_{n-1n-1} & tc_{n-1n} \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} c_{12} & c_{13} & \dots & c_{1n-1} & tc_{1n} & tc_{11} \\ c_{22} & c_{23} & \dots & c_{2n-1} & tc_{2n} & tc_{21} \\ c_{32} & c_{33} & \dots & c_{3n-1} & tc_{3n} & tc_{31} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n-12} & c_{n-13} & \dots & c_{n-1n-1} & tc_{n-1n} & tc_{n-11} \\ c_{n2} & c_{n3} & \dots & c_{nn-1} & tc_{nn} & tc_{n1} \end{pmatrix}.$$

Позначимо через  $(i, j)$  скалярну рівність  $(MC)_{ij} = (CM)_{ij}$ . Маємо:

$$\begin{aligned} (2, 1) : & \quad c_{11} = c_{22}, \\ (3, 2) : & \quad c_{22} = c_{33}, \\ & \quad \dots\dots\dots \\ (n-1, n-2) : & \quad c_{n-2n-2} = c_{n-1n-1}, \\ (n, n-1) : & \quad tc_{n-1n-1} = tc_{nn}. \end{aligned}$$

Оскільки  $t \neq 0$ , то звідси одержуємо

$$c_{11} \equiv c_{22} \equiv \dots \equiv c_{nn} \pmod{tK}. \tag{3}$$

Оскільки рядки матриці  $MC$  з номерами 1,  $n$  складаються з елементів з  $tK$ , то з (2) одержимо  $c_{ij} \equiv 0 \pmod{tK}$  ( $i = 1, n, j = 2, \dots, n-1$ ). Тобто

$$C \equiv \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n-2} & c_{2n-1} & c_{2n} \\ c_{31} & c_{32} & \dots & c_{3n-2} & c_{3n-1} & c_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n-11} & c_{n-12} & \dots & c_{n-1n-2} & c_{n-1n-1} & c_{n-1n} \\ c_{n1} & 0 & \dots & 0 & 0 & c_{nn} \end{pmatrix} \pmod{tK}.$$

Оскільки стовпці матриці  $CM$  з номерами  $n-1, n$  складаються з елементів з  $tK$ , то з (2) одержимо  $c_{ij} \equiv 0 \pmod{tK}$  ( $i = 1, \dots, n-2, j = n-1, n$ ). Тобто

$$C \equiv \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n-2} & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n-21} & c_{n-22} & \dots & c_{n-2n-2} & 0 & 0 \\ c_{n-11} & c_{n-12} & \dots & c_{n-1n-2} & c_{n-1n-1} & c_{n-1n} \\ c_{n1} & 0 & \dots & 0 & 0 & c_{nn} \end{pmatrix} \pmod{tK}.$$

Крім того, з (2) маємо

$$\begin{aligned} (2, 2) : & \quad c_{12} = c_{23}, \\ (3, 3) : & \quad c_{23} = c_{34}, \\ & \quad \dots\dots\dots \\ (n-2, n-2) : & \quad c_{n-3n-2} = c_{n-2n-1}, \end{aligned}$$

Звідки

$$c_{12} = c_{23} = \dots = c_{n-2n-1}. \quad (4)$$

Далі, з (2) також маємо

$$(2, 3) : \quad c_{13} = c_{24},$$

$$(3, 4) : \quad c_{24} = c_{35},$$

.....

$$(n-3, n-2) : \quad c_{n-4n-2} = c_{n-3n-1},$$

Звідки

$$c_{13} = c_{24} = \dots = c_{n-3n-1}. \quad (5)$$

Продовжуючи аналогічно, зрештою одержимо

$$c_{1n-3} = c_{2n-2} = c_{3n-1}. \quad (6)$$

Але крайні частини в рівностях (4)–(6) конгруентні 0 за модулем  $tK$ , тому

$$C \equiv \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ c_{21} & c_{22} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n-21} & c_{n-22} & c_{n-23} & \dots & c_{n-2n-2} & 0 & 0 \\ c_{n-11} & c_{n-12} & c_{n-13} & \dots & c_{n-1n-2} & c_{n-1n-1} & c_{n-1n} \\ c_{n1} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & c_{nn} \end{pmatrix} \pmod{tK}.$$

Врахувавши (3) та змінивши два останні стовпці місцями з одночасною зміною двох останніх рядків місцями у матриці  $C$ , одержимо, що  $C$  (яка комутує з  $M$ ) подібна над кільцем  $K$  до матриці  $n$ -го порядку  $C'$ , де

$$C' \equiv \begin{pmatrix} c_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ c_{21} & c_{11} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ c_{31} & c_{32} & c_{11} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{n-21} & c_{n-22} & c_{n-23} & \dots & c_{11} & 0 & 0 \\ c_{n1} & 0 & 0 & \dots & 0 & c_{11} & 0 \\ c_{n-11} & c_{n-12} & c_{n-13} & \dots & c_{n-1n-2} & c_{n-1n} & c_{11} \end{pmatrix} \pmod{tK}.$$

Серед таких матриць  $C'$ , а, отже, і їм подібних матриць  $C$ , немає, очевидно, таких ідемпотентів, які залишаються відмінними від одиничної і нульової матриці після редукції за модулем ідеала  $tK$ , які є серед матриць, що комутують з розкладними. Тому матриця  $M$  нерозкладна. Теорема доведена.

**3. Застосування в теорії зображень.** З результатів Гудивка П. М., Чухраня І. Б. [4] випливає, що скінченна  $p$ -група  $G$  порядку  $|G| > 2$ , над комутативним локальним кільцем характеристики  $p^s$  ( $s \geq 1$ ), яке не є полем ( $\text{Rad } K \neq 0$ ), має нееквівалентні нерозкладні матричні зображення довільного степеня  $n > 1$  не менше, ніж елементів в полі  $K/\text{Rad } K$  лишків кільця  $K$ .

**Теорема 3.** *Нехай  $K$  — комутативне локальне кільце характеристики  $p^s$  ( $s \geq 1$ ),  $\text{Rad } K = tK$ ,  $t$  — нільпотентний елемент степеня  $m > 1$ . Для деякої скінченної циклічної  $p$ -група  $G$  достатньо великого порядку  $|G|$ , існує принаймні 3 нееквівалентних нерозкладних матричних  $K$ -зображення довільного степеня  $n \geq 4$ .*

**Доведення.** Нехай  $u = t^{m-2}$ . Легко бачити, що  $up^2 = 0$  в кільці  $K$ . Нехай  $E$  — одинична матриця порядку  $n$  і  $S$  — довільна матриця порядку  $n$  над кільцем  $K$ , яка нільпотентна після редукції за модулем ідеалу  $\text{Rad } K = tK$ . Неважко перевірити, що  $S^n \equiv 0 \pmod{tK}$ ,  $S^{2n} \equiv 0 \pmod{t^2K}$  і відображення  $\Gamma$  вигляду:

$$a \rightarrow \Gamma(a) = E + uS$$

є  $K$ -зображенням циклічної групи  $G = \langle a \rangle$  порядку  $|G| = p^r$  такої, що  $p^r \geq 2n$ ,  $r \geq 2$ . Воно є розкладним тоді і тільки тоді, коли є розкладною матриця  $S$  після редукції за модулем ідеалу  $\text{Ann } u = \text{Ann } t^{m-2} = \{x \in K \mid t^{m-2}x = 0\} = t^2K$  в кільці  $K$ , а матрицям  $S, S'$  порядку  $n$  над кільцем  $K$ , нільпотентним після редукції за модулем ідеалу  $tK$ , відповідають еквівалентні зображення тоді і тільки тоді, коли матриці  $S, S'$  подібні після редукції за модулем ідеалу  $t^2K$ .

Оскільки  $\text{Rad}(K/\text{Ann } t^{m-2}) = \text{Rad}(K/t^2K)$  головний ідеал породжений  $t + t^2K$ ,  $t + t^2K \neq t^2K$ , то за теоремами 1, 2 матриці  $M(t, 1, n)$ ,  $M(t, 2, n)$ ,  $M(t, n - 1, n)$  нерозкладні після редукції за модулем ідеалу  $t^2K$ . Тому

$$a \rightarrow \Gamma(a) = E + uM(t, 1, n),$$

$$a \rightarrow \Gamma(a) = E + uM(t, 2, n),$$

$$a \rightarrow \Gamma(a) = E + uM(t, n - 1, n)$$

— нерозкладні  $K$ -зображення групи  $G$ . Оскільки  $n \geq 4$ , то матриці  $M(t, 1, n)$ ,  $M(t, 2, n)$ ,  $M(t, n - 1, n)$  мають різний ранг після редукції за модулем ідеалу  $tK$ . Тоді розглянуті 3 нерозкладні  $K$ -зображення групи  $G$  нееквівалентні. Теорема доведена.

Дослідження здійснювалися під керівництвом В. М. Бондаренка.

### Список використаної літератури

1. *Бондаренко В. М.* О подобии матриц над кольцом классов вычетов // *Мат. сб.*, К.: Наукова думка, 1976. — С. 275–277.
2. *Гудивок П. М., Тимшак О. А.* Про незвідні модулярні зображення скінченних  $p$ -груп над комутативними локальними кільцями // *Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем.* — 1998. — Вип. 3. — С. 78–83.
3. *Bondarenko V. M., Bortos M. Yu., Dinis M. Yu., Tylyshchak A. A.* Reducibility and irreducibility of monomial matrices over commutative rings, *Algebra and Discrete Mathematici* **16** (2), 2013. — P. 171–187.
4. *Гудивок П. М., Чухрай І. Б.* Про число нерозкладних матричних зображень даного степеня скінченної  $p$ -групи над комутативними локальними кільцями характеристики  $p^s$  // *Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ.* — 2000. — Вип. 5. — С. 33–40.
5. *Гудивок П. М.* Представления конечных групп над комутативными локальными кольцами. — Ужгород: Ужгородський нац. ун-т, 2003. — 119 с.

Одержано 29.05.2016