

Здоровье мужчин

ISSN 2307-5090



№1 (48) '2014

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С МАЯ 2002 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ

16-Й ЕЖЕГОДНЫЙ
КОНГРЕСС
ЕВРОПЕЙСКОГО
ОБЩЕСТВА СЕКСУАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ 9

ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА
У МУЖЧИН РАЗНОГО
ВОЗРАСТА И ПУТИ
ИХ КОРРЕКЦИИ 12

УМЕНЬШЕНИЕ
ВЫРАЖЕННОСТИ ВСЕХ
СИМПТОМОВ
ГИПЕРАКТИВНОГО
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СОЛИФЕНАЦИНА 50

МАТЕРИАЛЫ
ТРЕТЬЕГО СЪЕЗДА
СЕКСОЛОГОВ
И АНДРОЛОГОВ
УКРАИНЫ 105

КОМПЛЕКСНАЯ
ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ
АБАКТЕРИАЛЬНЫМ
ПРОСТАТИТОМ 114

ДВУХЭТАПНАЯ МЕТОДИКА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Полового члена
ПОСЛЕ ЕГО УТРАТЫ 159



Если у Вашего пациента с ДГПЖ:¹

✓ IPSS ≥ 8 баллов*

✓ ПСА ≥ 1,5 нг/мл

✓ Объем ПЖ >30 см³

Дуодарт
одна капсула,
один раз в день²

Дуодарт – это фиксированная по дозе комбинация в виде твердой капсулы, содержащей 0,5 мг дутастерида и 0,4 мг тамсулозина гидрохлорида³



Дуодарт – единственная зарегистрированная в Украине фиксированная комбинация α-блокатора и ингибитора 5α-редуктазы⁴

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Дуодарт**

Состав: 1 капсула содержит дутастерида 0,5 мг и тамсулозина гидрохлорида 0,4 мг. **Показания:** Лечение умеренных и тяжелых симптомов ДГПЖ. Уменьшение риска возникновения ОЗМ и необходимости хирургического вмешательства у пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами ДГПЖ. **Способ применения и дозы.** Взрослые (включая больных пожилого возраста). 1 капсула (0,5 мг/0,4 мг/сут для перорального приема через 30 мин после еды. Капсулу следует глотать целиком, не открывая и не разжевывая, так как при контакте с содержимым капсулы возможно раздражение слизистой оболочки рта и глотки. **Побочные реакции.** Головокружение, головная боль, потеря сознания; сердечная недостаточность; учащенное сердцебиение; постуральная гипотензия; импотенция; изменения (снижения) либидо; нарушения эрекции; заболевания молочных желез (включая гиперластезию и увеличение грудных желез); ретроградная эякуляция; приапизм; ринит; запор; диарея; тошнота; рвота; аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивница, локализованный и ангионевротический отек; алопеция (главным образом, утрата волос на теле); гипертрихоз; астеня. У некоторых пациентов, ранее получавших альфа-1-адреноблокаторы, включая тамсулозин - интраоперационный синдром атонической радужки. В ходе клинических исследований у мужчин, которые лечились дутастеридом, частота возникновения рака предстательной железы (РПЖ) с дифференцировкой по шкале Глисона 8-10 баллов была выше, чем на плацебо. Причиной связи между применением дутастерида и развитием низкодифференцированных форм РПЖ установлено не было. По данным клинических исследований и постмаркетинговых наблюдений сообщалось о случаях рака молочной железы у мужчин. **Противопоказания.** Не применять для лечения женщин и детей. Противопоказан препарат с повышенной чувствительностью к дутастерида, другим ингибиторам 5α-редуктазы, тамсулозину, другим компонентам препарата или к соев и арахису; больным с ортостатической артериальной гипотензией в анамнезе; больным с тяжелой печеночной недостаточностью. **Передозировка.** Специфического антагониста для дутастерида нет, в случае передозировки проводится симптоматическая и поддерживающая терапия. **Тамсулозин.** В случае острой артериальной гипотензии, после передозировки тамсулозином - обеспечить поддержку деятельности сердечно-сосудистой системы. **Применение в период беременности и кормления грудью.** Беременность. Дутастерид препятствует превращению тестостерона в дигидротестостерон, что может тормозить развитие наружных половых органов у плода мужского пола. **Кормление грудью.** Неизвестно, проникает ли дутастерид в грудное молоко женщины. **Дети.** Применение противопоказано. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Дутастерид. При долгосрочном применении комбинация дутастерида с лекарственными средствами, которые являются сильными ингибиторами фермента СYP3A4 (ритонавир, индинавир, нелфинавир, итраконазол, кетоконазол, которые вводились перорально), концентрация дутастерида в сыворотке крови может повышаться. Тамсулозин. Одновременное применение тамсулозина гидрохлорида с лекарствами, снижающими АД, в т.ч. вместе с обесблуживающими и др. альфа-1-адреноблокаторами может приводить к усилению гипотензивного действия. Дутастерид-тамсулозин следует с осторожностью применять в комбинации с циметидином, осторожно проводить одновременное лечение варфарином и тамсулозином. Диклофенак может повышать скорость выведения тамсулозина. **Условия хранения.** Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. **Срок годности.** 2 года. **Категория отпуска.** По рецепту.

**Перед применением Дуодарта ознакомьтесь с полной Инструкцией по применению, которая прилагается к лекарственному средству. Полные указания по применению препарата можно получить по запросу. Сообщить о нежелательном явлении или жалобе на качество препарата. Вы можете в ООО «ГлаксосмитКляйн Фармасьютикалс Украина» по тел. (044) 585-51-85. За дополнительной информацией обращайтесь в ООО «ГлаксосмитКляйн Фармасьютикалс Украина»: 02152, г. Киев, пр-т Павла Тычины, 1-8. Тел.: (044) 585-51-85, факс: (044) 585-51-86.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Р.С. МЗ Украины № УАУ/13330/01/01.

1. Roehrborn CG et al. Eur Urol 2010; 57:123-131.
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Дуодарт.
3. NICE clinical guideline 97. Lower urinary tract symptoms. The management of lower urinary tract symptoms in men. May 2010. Accessed 5 June 2013. at 16:18 GMT. www.nice.org.uk/nicetedia/line/12984/48557/48557.pdf.

ДГПЖ: доброкачественная гиперплазия предстательной железы.
*Мужская норма шкалы оценки симптомов при заболеваниях ПЖ (IPSS):
0-7 баллов, 8-19 средний, 20-35 тяжелой степени выраженности симптомов⁴
⁴ По состоянию на 18.12.2013 г.

DDRT/01/UA/18.12.2013/0112

Дуодарт
(дутастерид/тамсулозин) капсулы

ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ 1 (48)/2014

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ

ГУ «ИНСТИТУТ УРОЛОГИИ
НАМН УКРАИНЫ»

ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ПРОФЕССИОНАЛ»

ООО «УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ
СЕКСОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ»

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ И ДЛЯ ПИСЕМ

Украина, 03039, Киев, ул. Голосеевская, 13, офис 6.
Тел.: +38(044) 220-15-66, 220-15-67
E-mail: office@zdr.kiev.ua

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 01666

По вопросам подписки или приобретения обращаться
в почтовые отделения связи, в редакцию или на сайт:
www.medexpert.org.ua

Тираж – 4500 экз.
Периодичность издания – 4 выхода в год.
Журнал зарегистрирован в Государственном
комитете информационной политики, телевидения и
радиовещания Украины
Свидетельство о регистрации:
КВ 16364-4836ПР от 5.03.2010 г.

*Постановлением Президиума Высшей Аттестационной
Комиссии (ВАК) Украины № 1-05/2 от 27.05.2009
журнал «Здоровье мужчины» включен в перечень
специализированных научных изданий Украины в
области медицинских наук. В издании могут быть
опубликованы основные результаты
диссертационных работ*

*Журнал «Здоровье мужчины» включен
в международные наукометрические базы:
eLIBRARY.RU (РИНЦ), Science index) и Google Scholar,
а также в реферативную базу данных «Україна наукова»*

РЕКОМЕНДОВАНО

Ученым советом ГУ «Институт урологии
НАМН Украины». Протокол №3 от 18.03.2014 г.

Подписано к печати 31.03.2014 г.

Статьи, публикуемые в журнале
«ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ», — рецензированы.
Ответственность за достоверность фактов
и прочих сведений в публикациях несут авторы.
Ответственность за содержание рекламы, а также за
соответствие приводимых в рекламе сведений
требованиям законодательства несут рекламодатели.
Редакция и издатели не несут ответственности
за достоверность информации, опубликованной
в рекламных материалах.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов публикации.
Перепечатка материалов только
с письменного разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на журнал
«ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ» обязательна.

Фотовывод и печать

ООО «Макрос»
Киев, ул. Кржижановского, 4.
Телефон/факс: (044) 492-87-28, 492-87-29.

© Институт урологии НАМН Украины, 2014
© ООО «Медицинский издательский дом
«Профессионал», 2014
© Ассоциация сексологов и андрологов Украины, 2014

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК УКРАИНЫ

ГУ «ИНСТИТУТ УРОЛОГИИ НАМН УКРАИНЫ»
АССОЦИАЦИЯ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ
УКРАИНЫ

ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ ЗДОРОВ'Я ЧОЛОВІКА

Всеукраинский научно-практический журнал
Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
УКРАИНСКОГО ИНСТИТУТА СЕКСОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ

Почетный президент издания

А.Ф. Возианов, академик НАН и НАМН Украины

Главный редактор

И.И. Горпинченко, д-р мед. наук, профессор,
Генеральный директор УИСА, Президент
Ассоциации сексологов и андрологов Украины,
Главный сексопатолог МЗ Украины

Зам. главного редактора

Е.С. Щербинская, канд. мед. наук

Редакционная коллегия

И.А. Бабюк
С.А. Возианов
Б.М. Ворник
Ю.Н. Гурженко
П.М. Клименко
Г.С. Кочарян
Ф.И. Костев
В.Н. Лесовой
Е.А. Литвинец
А.В. Любарский
С.П. Пасечников
О.В. Ромащенко
С.Н. Шамраев
Л.М. Щеглов (Россия)
Dimitris Hatzichristou (Греция)
Juza Chen (Израиль)

Научные консультанты:

Ю.П. Вдовиченко
Г.И. Мавров
В.А. Пирогов

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

А.А. Попильнюк

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

И.Н. Лукавенко

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

Е.Я. Котляр

КОРРЕКТОР

Л.В. Сухих

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

С.О. Обедникова