

Здоровье мужчины

ISSN 2307-5090



№3 (54) '2015

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С МАЯ 2002 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ

**АЛЬФА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ
И ПРОФИЛАКТИКА
РАКА ПРОСТАТЫ –
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?** 13

**ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИЙ
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ –
ОТ РЕКОМЕНДАЦИЙ
К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ** 25

**УЛЬТРАЗВУК: СОВРЕМЕННЫЙ
МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО
ЭПИДИДИМИТА
И ЭПИДИДИМООРХИТА** 45

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ
БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТОЙ
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ** 48

**НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ТЕРАПИИ
ПРЕПАРАТАМИ ТЕСТОСТЕРОНА
ПРИ АНДРОГЕННОМ ДЕФИЦИТЕ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА** 73

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
НЕСТЕРОИДНЫМ
АНТИАНДРОГЕНОМ И В РЕЖИМЕ
НИЗКОДОЗИРОВАННОЙ
ЭСТРОГЕН-АНТИАНДРОГЕННОЙ
ТЕРАПИИ** 142



Если у Вашего пациента с ДГПЖ:¹

✓ IPSS ≥ 8 баллов*

✓ ПСА ≥ 1,5 нг/мл

✓ Объем ПЖ >30 см³

**Дуодарт
одна капсула,
один раз в день²**

Дуодарт – это фиксированная по дозе комбинация в виде твердой капсулы, содержащей 0,5 мг дутастерида и 0,4 мг тамсулозина гидрохлорида³



**Дуодарт – единственная зарегистрированная
в Украине фиксированная комбинация
α-блокатора и ингибитора 5α-редуктазы⁴**

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Дуодарт[®]

Состав: 1 капсула содержит дутастерида 0,5 мг и тамсулозина гидрохлорида 0,4 мг.

Показания. Лечение умеренных и тяжелых симптомов ДГПЖ. Уменьшение риска возникновения ОЗМ и необходимости хирургического вмешательства у пациентов с умеренными и тяжелыми симптомами ДГПЖ. **Способ применения и дозы.** Взрослым (исключая больных пожилого возраста), 1 капсула (0,5 мг/0,4 мг)сут для перорального приема через 30 мин после еды. Капсулу следует глотать целиком, не стывая и не разжевывая, так как при контакте с содержимым капсулы возможно раздражение слизистой оболочки рта и глотки. **Побочные реакции.** Головокружение, головная боль, потеря сознания, сердечная недостаточность, учащенное сердцебиение, постуральная гипотензия; импотенция, изменение (снижение) либидо, нарушение эякуляции, заболевания молочных желез (включая гиперестезию и увеличение грудных желез), ретроградная эякуляция, пролактинемия, сонливость, запор, диарея, тошнота, рвота; аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивница, ларингоспазм и ангионевротический отек; синдром Стивенса-Джонсона; алопеция (главным образом, утрата волос на теле), гемипарезы; депрессия; тактильная боль и отек; фибрилляция предсердий, аритмия, тахикардия, дислексия. У некоторых пациентов, ранее получавших α-1-адреноблокаторы, включая тамсулозин - интраоперационный синдром атонической релакции. Частота возникновения рака предстательной железы (РПЖ) с дифференцировкой по шкале Глиссона 8-10 баллов была выше, чем на placebo. Причиной связи между применением дутастерида и развитием низкодифференцированных форм РПЖ установлено не было. Сообщалось о случаях рака грудной железы у мужчин, носовых кровотечениях, снижении остроты зрения, мультиформной эритеме и эксфолиативном дерматите. **Противопоказания.** Не применяется для лечения женщин и детей. Противопоказан больным с повышенной чувствительностью к дутастериду, другим ингибиторам 5-редуктазы, тамсулозину, другим компонентам препарата или к его вспомогательным веществам. **Передозировка.** Специфического антидота для дутастерида нет, в случае передозировки проводится симптоматическая и поддерживающая терапия. **Тамсулозин.** В случае острой артериальной гипотензии, после передозировки тамсулозином - обеспечить поддержку деятельности сердечно-сосудистой системы. **Применение в период беременности и кормления грудью.** Беременность. Дутастерид препятствует превращению тестостерона в дигидротестостерон, что может тормозить развитие мужских половых органов у плода мужского пола. **Кормление грудью.** Неизвестно, проникает ли дутастерид в грудное молоко женщины. **Дети.** Применение противопоказано. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Дутастерид. При долгосрочном применении комбинации дутастерида с лекарственными средствами, которые являются сильнейшими ингибиторами фермента CYP3A4 (ритонавир, индинавир, нефазодин, эритромицин, итраконазол, кетоконазол, которые вводились перорально), концентрация дутастерида в сыворотке крови может повышаться. Тамсулозин. Одновременное применение тамсулозина гидрохлорида с лекарствами, снижающими АД, в т.ч. вместе с обескровливающими и др. α-1-адреноблокаторами может приводить к усилению гипотензивного действия. Дутастерид-тамсулозин следует с осторожностью применять в комбинации с циметидином, осторожно проводить одновременное лечение вальпронатом и тамсулозином. Диклофенак может повышать скорость выведения тамсулозина. **Условия хранения.** Хранить при температуре не выше 25°С в недоступном для детей месте. **Срок годности.** 2 года. **Категория отпуска.** По рецепту.

**** Перед применением Дуодарта ознакомиться с полной Инструкцией по применению, которая прилагается к лекарственному средству.**

Полные указания по применению препарата можно получить по запросу. Сообщить о нежелательных явлениях или жалобах на качество препарата Вы можете в ООО «ГласСинтеКлайн Фармасьютикалс Украина» по тел. (044) 585-51-85. За дополнительной информацией обращайтесь в ООО «ГласСинтеКлайн Фармасьютикалс Украина»: 02152, г. Киев, пр-т Павла Тычины, 1-8. Тел.: (044) 585-51-85, факс: (044) 585-51-92.

Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников. Р.С. МЗ Украины № UA/13330/01/01.

1. Roehrborn CG et al. Eur Urol 2010; 57:123-131.

2. Инструкция по медицинскому применению препарата Дуодарт.

3. NICE clinical guideline 97. Lower urinary tract symptoms. The management of lower urinary tract symptoms in men. May 2010. Available from 2013 at <http://16.16.0817.1111/uk/clinicalguidance/97/9794484557148557.pdf>

ДГПЖ: доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

¹ Международная шкала оценки симптомов при заболевании ПЖ (IPSS).

² 0-7 легкой, 8-19 средней, 20-35 тяжелой степени выраженности симптомов³

³ По состоянию на 09.09.2015 г.

UA/RPharm/0016/15.09.09

Дуодарт
(дутастерид/тамсулозин) капсулы

ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ 3 (54)/2015

УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ

ГУ «ИНСТИТУТ УРОЛОГИИ
НАМН УКРАИНЫ»

ЩЕРБИНСКАЯ Е.С.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ

Украина, 03039, Киев, а/я 4.
Тел.: +38(044) 220-15-41, 220-15-43
E-mail: office@zdr.kiev.ua

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 01666

По вопросам подписки или приобретения обращаться в почтовые отделения связи, в редакцию или на сайт: www.medexpert.org.ua

Тираж – 4500 экз.
Периодичность издания – 4 выхода в год.
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете информационной политики, телевидения и радиовещания Украины
Свидетельство о регистрации:
КВ 21040-10840ПР от 17.11.2014 г.

Постановлением Президиума Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) Украины № 1-05/2 от 27.05.2009 журнал «Здоровье мужчины» включен в перечень специализированных научных изданий Украины в области медицинских наук. В издании могут быть опубликованы основные результаты диссертационных работ

Журнал «Здоровье мужчины» включен в международные наукометрические базы: eLIBRARY.RU (РИНЦ, Science index) и Google Scholar, а также в реферативную базу данных «Україніка наукова»

РЕКОМЕНДОВАНО

Ученым советом ГУ «Институт урологии НАМН Украины». Протокол №8 от 27.10.2015 г.

Подписано к печати 29.10.2015 г.

Статьи, публикуемые в журнале «ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ», — рецензированы. Ответственность за достоверность фактов и прочих сведений в публикациях несут авторы. Ответственность за содержание рекламы, а также за соответствие приводимых в рекламе сведений требованиям законодательства несут рекламодатели. Редакция и издатели не несут ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных материалах. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикации. Перепечатка материалов только с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка на журнал «ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ» обязательна.

Фотовывод и печать

Типография «Аврора-принт»,
г. Киев, ул. Причальная, 5, тел. (044) 550-52-44

© Институт урологии НАМН Украины, 2015
© Ассоциация сексологов и андрологов Украины, 2015
© Щербинская Е.С.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК УКРАИНЫ

ГУ «ИНСТИТУТ УРОЛОГИИ НАМН УКРАИНЫ»
АССОЦИАЦИЯ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ
УКРАИНЫ

ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ ЗДОРОВ'Я ЧОЛОВІКА

Всеукраинский научно-практический журнал
Официальное издание Ассоциации сексологов и андрологов Украины

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
УКРАИНСКОГО ИНСТИТУТА СЕКСОЛОГИИ И АНДРОЛОГИИ

Почетный президент издания

А.Ф. Возианов, академик НАН и НАМН Украины

Главный редактор

И.И. Горпинченко, д-р мед. наук, профессор,
Генеральный директор УИСА, Президент
Ассоциации сексологов и андрологов Украины,
Главный сексопатолог МЗ Украины

Зам. главного редактора

Е.С. Щербинская, канд. мед. наук

Редакционная коллегия

С.А. Возианов
Б.М. Ворник
В.Н. Григоренко
Ю.Н. Гурженко
Г.С. Кочарян
Ф.И. Костев
Ю.В. Кукурекин
В.Н. Лесовой
Е.А. Литвинец
С.П. Пасечников
М.Г. Романюк
О.В. Ромащенко
Ю.П. Серняк
С.Н. Шамраев
А.В. Шуляк
Л.М. Щеглов (Россия)
Dimitris Hatzichristou (Греция)
Juza Chen (Израиль)

Научные консультанты:

Ю.П. Вдовиченко
В.И. Степаненко
Г.Н. Дранник

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

А.А. Попильнюк

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

И.Н. Лукавенко
Е.О. Панова

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

Е.Я. Котляр

КОРРЕКТОР

Л.В. Сухих

ДИЗАЙН И ВЕРСТКА

С.О. Обедникова