

Здоровье Мужчины

ISSN 2307-5090



№4 (63) '2017

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С МАЯ 2002 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ СЕКСОЛОГОВ И АНДРОЛОГОВ УКРАИНЫ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 5

ИММУННЫЕ ФАКТОРЫ
В ПАТОГЕНЕЗЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
ФОРМ ХРОНИЧЕСКОГО
АБАКТЕРИАЛЬНОГО
ПРОСТАТИТА 9

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ФИТОТЕРАПИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ
ВТОРИЧНОГО КАЛЬКУЛЕЗНОГО
ПИЕЛОНЕФРИТА
И В МЕТАФИЛАКТИКЕ
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 30

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ЭРЕКТИЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ 64

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА ЭТИОПАТОГЕНЕЗ
И ЛЕЧЕНИЕ
ПОСТЭЯКУЛЯТОРНОЙ
БОЛИ 71

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ГЕСТАЦИОННЫМ
ПИЕЛОНЕФРИТОМ 110

Флосін®
Тамсулозину гідрохлорид

30 капсул твердих з модифікованим вивільненням
Для перорального застосування

Засіб для лікування розладу сечовипускання як наслідку доброїсної гіперплазії передміжурової залози

BERLIN-CHEMIE MENARINI

Простамол® Уно

Дієча речовина: гулий спіртовий екстракт із плодів пальми північноафриканської (Ветива серена) (9 - 11:1)

30 капсул м'яких - Для перорального застосування

Засіб для лікування доброїсної гіперплазії передміжурової залози та хронічного простатиту

Капсули м'які по 320 мг
Дозування: по 1 м'якій капсулі один раз на добу.

BERLIN-CHEMIE MENARINI

Лікування розладів сечовипускання при ДГПЗ I та II стадії¹

Швидкий початок дії²

Уроселективний:³
не впливає клінічно значущого зниження АТ⁴

Діє цілодобово⁴

1 капсула на добу

24

Гальмування росту передміжурової залози¹

Покращення сечовипускання^{1,4}

Протизапальна дія¹

Лікування хронічних простатитів¹

Не впливає на статеву функцію¹

Флосін®
Тамсулозину гідрохлорид 0,4 мг

СКОРочЕНА ІНСТРУКЦІЯ

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Капсули тверді з модифікованим вивільненням.

ФАРМАКОТРАПЕВТИЧНА ГРУПА. Засоби, що застосовуються при доброїсній гіперплазії передміжурової залози. Агоністи альфа-адренорецепторів. Код АТХ G04C A02.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. Блокує альфа-1 та альфа-2 рецептори на простатичній тканині, чорноспинчастині, аорти, адренорецепторів нирок, і т.д. Це призводить до зменшення тонусу гладкої мускулатури передміжурової залози, сприяє відтоку кавалі. Також збільшує об'єм сечовипускання при доброїсній гіперплазії передміжурової залози та сприяє відтоку кавалі, як зменшує обструкцію сечовипускання каналу, і тим самим, поліпшує сечовипускання. Він також покращує репродуктивну функцію, яка часто порушена через несвідомість сім'яної м'язів. У дослідженні тамсулозину клінічно значущого зменшення діаметру залозного каналу не спостерігалися.

ПОКАЗАННЯ. Лікування фізіологічного розладу з бою м'якої консистенції сечової при доброїсній гіперплазії передміжурової залози (ДГПЗ).

ПРТИПОКАЗАННЯ. Гіперчувствівість до тамсулозину гідрохлориду, вроджені міждиментричні чи нервової м'язової передачі, набір, або до будь-якої з домішних речовин, наявність в історії хронічної ниркової недостатності, тяжка печінкова недостатність.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Рекомендована доза для дорослих - 1 капсула цілодобово після їди.

ПОБОЧНІ РЕАКЦІЇ: запаморочення, головний біль, ниркова недостатність, пемічний, еректильний дисфункція, рвота, запор, нудота, біль у животі, везикулярна еритема, набір ваги, сонливість, кропив'ячка, риногенна еозинофілія, кропив'ячка, астена.

КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ. За рецептом.

За повною детальною інформацією звертайтеся до інструкції для медичного застосування зазначеного МОЗ України 24.11.2016 № 1275. РІП № ІА 0350/01/01.

Простамол® уно
Екстракт спіртовий екстракт із плодів пальми північноафриканської (Ветива серена) 320 мг

СКОРочЕНА ІНСТРУКЦІЯ

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Капсули м'які.

ФАРМАКОТРАПЕВТИЧНА ГРУПА. Засоби для лікування доброїсної гіперплазії передміжурової залози. Код АТХ G04C B02.

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ. Для вступу в дію після прийому (Синтеза передміжурової залози з його зменшенням ефектом, а саме з блокуванням за звичайно ДГП з рецепторів, що призводить до танування діаметру 5-адреналіну, інші фактори, що також можуть гальмувати ріст тканин передміжурової залози, гальмування на клітинному рівні процесів збільшення передміжурової залози, збільшення для звичайно гальмування дії 5-альфа редуктази, гальмування пролиферативної активності передміжурової залози, протизапальна дія. Простамол® Уно не впливає на статеву функцію.

Простамол® Уно покращує подвійне збільшення тканин передміжурової залози.

ПОКАЗАННЯ. Розлад сечовипускання при доброїсній гіперплазії передміжурової залози I та II стадії та хронічному простатиті по класифікації Алякс.

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Порушення чутливості до дієвої речовини або до інших домішних речовин.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Застосовувати по 1 м'якій капсулі раз на добу.

ПОБОЧНІ РЕАКЦІЇ: рідко - гастроінтестинальні розлади, везикулярна еритема, дисфункція з боку травного тракту, нудота, біль у животі, алергічні реакції, набір ваги, везикулярна еритема або набір ваги.

КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ. Без рецепта.

За повною детальною інформацією звертайтеся до інструкції для медичного застосування зазначеного МОЗ України від 20.03.2017 № 295.

Виробник Флосін® - Менаріні - Фін Кален ТіОХ, Німеччина.
Місць вироблення: Дольфінштрассе 7-10, 01097 Дольфін, Німеччина.

Виробник Простамол® уно - BERLIN-CHEMIE АГ
Місць вироблення: Сіндлер Вай 128, 12489 Берлін, Німеччина.

За додатковою інформацією щодо лікарського засобу звертайтеся до:
Представництва «Фарма Хелп» А. Менаріні Україна ТіОХ
в Київ, 02098, м.п. Борошівська, 28 Тел. 454 33 88. Факс: 454 33 88

Інформація про лікарський засіб, призначений для медичного та фармацевтичного призначення.
ІА_Ріп_№01-2017_ріп_02
Затверджено до друку 01.04.2017