

Здоровье женщины

ISSN 1992-5921



№9 (85) '2013

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 15

РОЛЬ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ
В ПАТОГЕНЕЗЕ ГИПЕРПЛАЗИИ
ЭНДОМЕТРИЯ.
НУЖНА ЛИ КОРРЕКЦИЯ? 30

ПРОБЛЕМА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
У ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 42

КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА 55

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ
У БЕРЕМЕННЫХ И ЕЕ
КОРРЕКЦИЯ 58

КЛИНИЧЕСКИЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ
АСПЕКТЫ ДВУРОГНОЙ
И СЕДЛОВИДНОЙ МАТКИ 66

АБДОМИНАЛЬНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ СОЧЕТАННОЙ
ПАТОЛОГИИ МАТКИ 81


ЭНДОМЕТРИОЗ У ПАЦИЕНТОК,
СТРАДАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕМ,
И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ 157



німесулід®

- 30 таблеток для быстрого действия
- 100 мг в каждой таблетке по 100 мг для быстрого действия
- курс лечения до 15 дней

Зменшення концентрації PGF2α в менструальних виділеннях на фоні лікування німесулідом



Ефективна дисменорея

Більше ніж 1400 пацієнток у клінічних дослідженнях підтвердили високу ефективність німесулідом в зменшенні болю при первинній дисменореї.*

* Дані за період з 1998 по 2012 рік, отримані з 14 клінічних досліджень з використанням німесулідом у порівнянні з плацебо. Найвища ефективність була досягнута при лікуванні болю в перші 24 години після початку менструації. Найвища ефективність була досягнута при лікуванні болю в перші 24 години після початку менструації. Найвища ефективність була досягнута при лікуванні болю в перші 24 години після початку менструації.

Інформація про лікарський препарат для фахівців: німесулідом є селективним інгібітором циклооксигенази (COX-2). Найвища ефективність була досягнута при лікуванні болю в перші 24 години після початку менструації. Найвища ефективність була досягнута при лікуванні болю в перші 24 години після початку менструації.



Німесулідом є селективним інгібітором циклооксигенази (COX-2). Найвища ефективність була досягнута при лікуванні болю в перші 24 години після початку менструації. Найвища ефективність була досягнута при лікуванні болю в перші 24 години після початку менструації.

Німесулідом є селективним інгібітором циклооксигенази (COX-2). Найвища ефективність була досягнута при лікуванні болю в перші 24 години після початку менструації. Найвища ефективність була досягнута при лікуванні болю в перші 24 години після початку менструації.

© 2013 Берлін-Хемі Менаріні. Всі права захищено.