

# Здоровье женщины

ISSN 1992-5921

№5 (111) '2016

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ  
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



**ADAMED**  
GRUPA

**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ  
(КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ)** 10

**СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ПАТОГЕНЕЗ  
ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК  
ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ** 67

**ПЛАЦЕНТА INCRETINA:  
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ** 84

**МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ  
ПРОБЛЕМА:  
СИНДРОМ КУШИНГА** 143

**ЗАДЕРЖКА РОЖДЕНИЯ  
ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ПЛОДОВ  
ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ  
БЕРЕМЕННОСТИ ТРОЙНЕЙ  
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)** 148

**ЛЕЙОМИОСАРКОМА МАТКИ –  
ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ** 156



**Лютеина**  
Микронизованный прогестерон

Сучасні форми мікронізованого  
натурального прогестерону



**Сублінгвальна форма  
швидкий ефект<sup>1</sup>**

♥ Ефект вже через  
30 хвилин

**Ранні та пізні  
терміни<sup>1,2</sup>**  
Доказова медицина

**Вагінальна форма  
тривалий ефект<sup>2</sup>**

♥ Ефект протягом 24 годин ♥  
Інноваційна форма 200 мг ♥

**ШВИДКА ТА МАКСИМАЛЬНА БІОДОСТУПНІСТЬ  
ПРИ БУДЬ-ЯКОМУ СПОСОБІ ЗАСТОСУВАННЯ<sup>1</sup>**

**ТАБЛЕТКИ ВАГІНАЛЬНІ № 20, 30.** Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг, 100 мг та 200 мг з аплікатором. Показання: лікування порушень, пов'язаних з дефіцитом прогестерону, порушення менструального циклу, болісні менструації, ановуляційні цикли, передменструальний синдром, дисфункціональні маткові кровотечі, ендометріоз матки, безпліддя, значні і загрозові викидні, недостатність лептеїнової фази передменопаузального періоду, а також у гормональній замісній терапії та у програмі штучного запліднення. Побічні реакції: під час застосування Лютеїна, вагінальних таблеток, що містить прогестерон, ідентичний ендогенному гормону, побічні ефекти спостерігалися спорадично. В окремих випадках відзначалися сонливість, порушення концентрації уваги, відчуття страху, депресивні стани, головний біль та запаморочення (дивіться пошу інструкції). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, зловживання молочних залоз. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/01/01, UA/5244/01/02, UA/5244/01/03.

**ТАБЛЕТКИ СУБЛІНГВАЛЬНІ № 30.** Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг. Показання: лікування ендогенного дефіциту прогестерону у формі порушення менструального циклу, вторинної аменореї, ановуляторних циклів, передменструального синдрому, функціональних маткових кровотеч, при штучному заплідненні, безплідді, пов'язаному з лютеїновою недостатністю, звичайному невиношуванні та загрози мимовільного абортів при дефіциті прогестерону, недостатності жовтого тіла, вторинній аменореї, запобігання гіпертрофії ендометрія у жінок, які приймають естрогени (наприклад, при гормональній замісній терапії). Побічні реакції: у подібних випадках відзначалися сонливість, порушення концентрації та інші (дивіться пошу інструкції). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, період годування груддю, підозрювана або підтверджена неоплазія грудей або статевих органів, невиключені кровотечі зі статевих шляхів. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/02/01.



Виробник: ТОВ «АДАМЕД», Польща.  
Публікаційний формальний завод:  
Польфа А.Т., Польща, Зависинь: ТОВ «АДАМЕД»,  
Польща. Продовжено в Україні:  
01015, м. Київ, вул. Радича, 10.  
Тел./факс: (044) 280-57-16, 280-57-84

1. Хомик Н.В., Мамур В.И. Клинико-фармакологические особенности современных лекарственных форм микронизованного прогестерона, применяющихся во время беременности // Здоровье женщины. – 2014. – № 4(90).  
2. Инструкция для медицинского использования препарата Лютеина.  
\*Дополнительная информация содержится в инструкции для медицинского использования препарата. Информация предназначена для профессиональной деятельности фармацевтов, акушерок и др.



9 771992 592002 >