

Здоровье женщины

ISSN 1992-5921



№6 (112) '2016

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

**АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
IMSI ПРИ ОПЛОДОТВОРЕНИИ
IN VITRO** 28

**НЕРВОСОХРАНЯЮЩАЯ
РАДИКАЛЬНАЯ ГИСТЕРЭКТОМИЯ
У БОЛЬНЫХ
ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ** 46

**ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДРАЗРЕШЕНИЕ
ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ
МАРФАНА (СЛУЧАЙ
ИЗ ПРАКТИКИ)** 62

**ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ** 121

**СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ
МАСТОПАТИИ** 149

Прожестожель® *гель*
для місцевого лікування
масталгії та мастопатії¹



Діє локально у тканинах молочної залози:

- пригнічує проліферацію та мітотичну активність епітелію протоків¹
- зменшує набряк тканин молочних залоз¹
- місцево блокує рецептори пролактину²



Прожестожель®. Склад та форма випуску: гель 10 мг/г по 80 г у тубі в комплекті зі шпателем-дозатором №1.

¹ Інструкція з медичного застосування препарату. РС UA 3839/01/01 от 17.02.2016.

² Тагарчук Т.Ф. Масталгія з точки зрення гінеколога-ендокринолога// З турботою про жінку, травень-червень 2014.

ПОКАЗАННЯ:
Доброякісні захворювання молочної залози:

- есенціальна мастодіялія;
- мастодіялія, пов'язана з доброякісним захворюванням молочної залози (комплексне лікування доброякісної мастопатії на фоні прогестеронової недостатності).

Прожестожель® не показаний для застосування чоловікам.

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.


Рак молочної залози.

Вузлові форми фіброзно-кістозної мастопатії.

Пухлини (пухлинноподібні утворення) молочної залози неясної етіології.

Рак статевих органів (як монотерапія).

BESINS
HEALTHCARE
Innovating for Well-being



9 771992 592002 >