

# Здоровье женщины

№9 (115) '2016

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ  
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 10

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ  
КАК МАРКЕР ПЛАЦЕНТАРНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 47ОСОБЕННОСТИ GESTАЦИОННОЙ  
ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ  
ТОКСИЧЕСКИХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ  
И ЭРИТРОЦИТАХ ЖЕНЩИН  
РАЗНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО  
ВОЗРАСТА, РОЖАЮЩИХ ВПЕРВЫЕ 52ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО  
ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ  
С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ  
ПРОЦЕССАМИ ГРУДНЫХ ЖЕЛЕЗ 72ЗАДЕРЖКА РОСТА ПЛОДА:  
ДИАГНОСТИКА И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ  
ПОСЛЕДСТВИЯ 99ПЕРСИСТЕНЦИЯ БИОПЛЕНОК  
*GARDNERELLA VAGINALIS*  
НА ВАГИНАЛЬНОМ ЭПИТЕЛИИ  
ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ  
ПЕРОРАЛЬНЫМ  
МЕТРОНИДАЗОЛОМ 112

Bionorica®

Порушення менструального циклу?

Циклодинон®


нормалізує менструальний цикл<sup>1</sup>відновлює гормональну рівновагу<sup>2</sup>не містить гормонів<sup>3</sup>

Розкриваючи силу рослин

**Циклодинон®. Показання для застосування.** Порушення менструального циклу /або безпліддя пов'язане з недостатністю жовтого тіла. **Спосіб застосування та дози.** Препарат приймають по 1 таблетці 1 раз на день з достатньою кількістю води. Лікування триває протягом 3 місяців без перерви на час менструації. **Протипоказання.** Не можна застосовувати у випадку підвищеної чутливості до плодів прутняку звичайного або до будь-якого із допоміжних компонентів препарату. **Особливі застереження.** У випадку виникнення болю або набуття молочних залоз, а також при порушенні менструального циклу рекомендується проконсультуватися з лікарем, оскільки ці симптоми можуть свідчити про захворювання, що потребує медичного дослідження. **Застосування у період вагітності або годування груддю.** Не можна застосовувати у період вагітності або годування груддю (може спричинити зменшення лактації). **Побічні реакції.** Після застосування лікарських засобів, які містять плоди прутняку звичайного, повідомлялося про такі симптоми, як головний біль, свербіж або шлуноково-кишковий дискомфорт, який проявляється нудотою, болем у ділянці шлунка. Можливі прояви підвищеної чутливості у вигляді висипу, кропив'янки, набряку Квінке, утруднення дихання та ковання.

1. В.П. Сметник, Л.Б. Бутарева Науковий центр акушерства, гінекології та перинатології РАМН, Москва. Журнал «Проблеми репродукції», том 11, 5/2005, стр. 50-54. 2. W.Wuttke et al 1997, Geb Fra 57, 569-574. 3. Інструкція для медичного застосування препарату Циклодинон®. Краплі оральні. Р.п. № UA/0267/01/01 від 23.12.13. Циклодинон®. Таблетки, вкриті оболонкою. Р.п. № UA/0267/02/01 від 23.12.13. Виробник: Біонорика (Німеччина).

ТОВ «Біонорика», Україна, вул. Княжий Затон, 9, оф. 392, Київ, 02095; тел.: (044) 521-86-00, факс: (044) 521-86-01, e-mail: info@bionorica.ua  
Для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Матеріал призначений виключно для спеціалістів у галузі охорони здоров'я.



9 771992 592002 &gt;