

Здоровье женщины

ISSN 1992-5921



№10 (126) '2017

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:
ГОРМОНАЛЬНАЯ
КОНТРАЦЕПЦИЯ** 10

**ТЯЖЕЛАЯ ПРЕЭКЛАМПСИЯ.
CALM DOWN – АЛГОРИТМ
ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА** 28

**ОЖИРЕНИЕ У ЖЕНЩИНЫ
КАК ПРИЧИНА РЕПРОДУКТИВНЫХ
ПРОБЛЕМ** 34

**КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ** 85

**СПОРАДИЧЕСКОЕ И ПРИВЫЧНОЕ
НЕВЫНАШИВАНИЕ –
СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ
ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИЮ** 122

**ЭНДОМЕТРИОЗ: ДИАГНОСТИКА
И МЕНЕДЖМЕНТ** 147



Лютеїна
Мікронізований прогестерон

Сучасні форми мікронізованого
натурального прогестерону



"Жінка носить дитину –
9 місяців в собі,
2 роки на собі,
все життя в серці"

**Сублінгвальна форма
швидкий ефект¹**

♥ Ефект вже через
30 хвилин

**Ранні та пізні
терміни^{1,2}**

Доказова медицина

**Вагінальна форма
тривалий ефект²**

Ефект протягом 24 годин ♥
Інноваційна форма 200 мг ♥

**ШВИДКА ТА МАКСИМАЛЬНА БІОДОСТУПНІСТЬ
ПРИ БУДЬ-ЯКОМУ СПОСОБІ ЗАСТОСУВАННЯ¹**

ТАБЛЕТКИ ВАГІНАЛЬНІ №20, 30. Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг, 100 мг та 200 мг з аплікатором. Показання: лікування порушень пов'язаних з дефіцитом прогестерону, порушення менструального циклу, болісні менструації, ановуляційні цикли, передменструальний синдром, дисфункціональні маткові кровотечі, ендометриоз матки, безпліддя, заміни і загрози вивідки, недостатність лютеїнової фази передменструального періоду, а також у гормональній замісній терапії та у програмі щупного запліднення. Побічні реакції: під час застосування Лютеїни, вагінальних таблеток, що містять прогестерон, ідентичний ендокринному гормону, побічні ефекти спостерігалися спорадично. В окремих випадках відзначалися сонливість, порушення концентрації уваги, відчуття страху, депресивні стани, головний біль та запаморочення (дивіться повну інструкцію). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, зловживання алкоголем, лактоза不耐症, незвичайні кровотечі зі статевих шляхів. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/01/01, UA/5244/01/02, UA/5244/01/03.

ТАБЛЕТКИ СУБЛІНГВАЛЬНІ № 30. Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг. Показання: лікування ендокринного дефіциту прогестерону у формі порушень менструального циклу, вторинної аменореї, ановуляторних циклів, передменструального синдрому, функціональних маткових кровотеч, при штучному заплідненні, безплідді, пов'язаному з ектопічною недостатністю, звичному невипусканні та загрози немовільного аборту при дефіциті прогестерону, недостатності жовтого тіла, вторинної аменореї, запобігання гіпертрофії ендометрію у жінок, які приймають естрогени (наприклад, при гормональній замісній терапії). Побічні реакції: у поодиноких випадках відзначалися сонливість, порушення концентрації та інші (дивіться повну інструкцію). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, період годування груддю, підозрювана або підтверджена неоперабельна злоякісна пухлина молочної залози, незвичайні кровотечі зі статевих шляхів. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/02/01.



Виробник: ТОВ «АДАМЕД», Польща.
Ліцензійний фармацевтичний завод
Польща А.Т., Польща. Замовник: ТОВ «АДАМЕД»,
Польща. Представництво в Україні:
01015, м. Київ, вул. Руська, 10.
Тел./факс: (044) 280-97-16, 280-97-84

1. Хоми Н.В., Мантур В.І. Клініко-фармакологічні особливості сучасних лікувальних форм мікронізованого прогестерону, застосованих у період вагітності // Здоров'я жінки. – 2014. – № 4(90).
2. Інструкція для медичного застосування препарату Лютеїна.
*Коротка інструкція для медичного застосування препарату Лютеїна. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Інформація призначена для професійної діяльності фахівців охорони здоров'я.



9 771992 592002 >