

# СОДЕРЖАНИЕ 3 (119)/2017

## ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Сучасні аспекти раціонального вибору нестероїдних протизапальних препаратів: погляд гінеколога (Клінічна лекція)  
В.І. Пирогова .....11

## НОВОСТИ. СОБЫТИЯ

- «Зміщення парадигми в питаннях ранньої профілактики вроджених вад розвитку для народження здорових дітей»: міждисциплінарна конференція із залученням вітчизняних та іноземних науковців .....16

## АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- Реалії сучасної акушерської практики  
С.І. Жук, О.Д. Щуревська, Т.В. Пехньо .....20
- Оксидативний стрес як важливий патогенетичний механізм розвитку змін репродуктивного здоров'я у жінок з соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу  
Вл.В. Подольський, В.В. Подольський, І.К. Тіщенко, С.К. Стрижак .....23
- Гиперпролактинемия в генезе стресс-индуцированного бесплодия. Возможности фитотерапии  
Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, С.И. Регада, Н.В. Яроцкая, А.А. Горохова .....28

## В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

- Ефективність загальностимулювальної регулювальної терапії у дівчаток-підлітків із гіпоменструальним синдромом  
С.О. Левенець, О.Г. Верхошанова, Н.О. Удовікова, Д.А. Кашкалда .....37
- Оптимізація тактики ведення вагітних з перинатальними втратами в анамнезі  
Л.І. Воробей .....41
- Особливості оваріального резерву у жінок з безплідністю після органозберігальних операцій на органах малого тазу  
А.Є. Дубчак, О.Д. Дубенко, О.В. Мілевський, Н.М. Обейд .....46

- Шляхи зниження частоти кесарева розтину в умовах типового міського пологового будинку  
Н.П. Гончарук, Н.Р. Ковида .....50

- Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції  
С.М. Геряк, Н.В. Петренко, В.Ю. Добрянська, О.А. Якимчук .....54

- Діагностика, профілактика та прогнозування перинатальної патології при аномаліях плацентациї (ретрохоріальні гематоми та аномалії розташування плаценти)  
С.А. Куріцина .....60

## КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

- Клінічний випадок поєднання лейоміоми матки та вагітності  
М.В. Макарєнко, Д.О. Говсеєв, Л.І. Мартинова, К.В. Месропян .....65

## АКУШЕРСТВО

- Оцінка взаємозв'язку особистісної та ситуативної тривожності з типом темпераменту у вагітних  
В.Г. Сюсюка .....69
- Профілактика венозного тромбоемболізму у вагітних груп ризику: клініко-інструментальне дослідження  
В.І. Медведь, М.Є. Кирильчук, О.В. Ісламова, А.І. Автомеєнко, Т.Р. Савка .....73
- Профілактика акушерської та перинатальної патології при використанні родинно орієнтованих технологій під час вагітності та пологів  
С.Ю. Вдовиченко .....79

## ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Цитологическое заключение в соответствии с терминологической системой The Bethesda system 2014 года: что нового?  
О.В. Рыкова, Т.П. Богомаз .....82

# ПОЛІЖИНАКС®

Ністатин, Неоміцин, Поліміксин В

Унікальна комбінація широкого спектра дії  
для ефективного лікування вагітиту\*

3 активні речовини\*

Ністатин  
Неоміцин  
Поліміксин В

Бактерії  
Грам +



Гриби роду  
Candida



Бактерії  
Грам -



**ПОЛІЖИНАКС**

Застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування - 12 днів, профілактичний курс - 6 днів.



**ПОЛІЖИНАКС ВІРГО**

Для застосування у дитячій гінекологічній практиці.

Вміст 1 капсули вводиться інтравагінально (попередньо відізвавши кінець капсули) перед сном протягом 6 днів поспіль.

UA/10/093/01/01 Наказ МОЗ №1019 від 29.12.2014



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні,  
01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська/Михайлівська, буд. 6/5.

\* Інструкція для медичного застосування препарату «Поліжинакс» та «Поліжинакс Вірго».

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

Характеристики препарату дивіться на стор. 72

# ТОТЕМА®

залізо, мідь, марганець

ФРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ –  
ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!



тотема Fe<sup>2+</sup>

Mn Cu

- Швидка гематологічна відповідь<sup>1</sup>
- Органічні солі заліза, міді та марганцю<sup>2</sup>
- Можливе застосування під час вагітності<sup>2</sup>
- Дозволено дітям з 1-го місяця<sup>2</sup>
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ<sup>3</sup>



<sup>1</sup> С.В. Семіонкін. Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни «Семский врач»; № 1; 2012; стр. 37-42.

<sup>2</sup> Інструкція для медичного застосування.

<sup>3</sup> WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments – October 2013).



Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ» в Україні: 01001, Київ, вул. М.Житомирська, 6, тел. (044) 278 06 38, [innotech@innotech.com.ua](mailto:innotech@innotech.com.ua)

**Склад лікарського засобу:** 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді заліза глюконату) 50 мг; марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг; міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг.

**Показання для застосування.** Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. **Протипоказання.** Надлишок заліза в організмі. Регулярні гемотрансфузії. Одночасне застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізоферфрактерна анемія. Анемія, пов'язана з недостатністю медулярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Спадкова непереносимість фруктози. **Побічні ефекти.** З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, печія, закрел, діарея. Можливе тимчасове забарвлення випороження у червоний колір, що не має клінічного значення та ніяких наслідків для здоров'я. Можлива тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести розчин препарату у відповідному напої та під час застосування не тримати його довго у ротовій порожнині. Можливі алергічні реакції (свербіж, висипання, кропив'янка, анафілактична реакція); біль у животі, блювання.

**Спосіб застосування та дози.** Вміст ампули слід розчинити у простій чи підсопудженій воді або в будь-якому іншому напої, крім чаю, кави, молока та напоїв, що містять алкоголь. Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям віком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії. Профілактика анемії та залізодефіциту: для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула) на день протягом другого та третього триместру вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності. **Категорія відпуску.** Без рецепта. Реєстраційне посвідчення №UA/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 23.08.2013

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

# СОДЕРЖАНИЕ 3 (119)/2017

## ГИНЕКОЛОГИЯ

Оптимізація тактики ведення пацієнок з ускладненою ектопією шийки матки  
В.І. Пирогова, Ю.Ю. Мазур, С.О. Шурпак .....86

Somatic status of the patients with different forms of endometrial pathology in late reproductive age and premenopausal period  
S.M. Korniyenko .....93

Соматический статус пациенток с разными формами патологии эндометрия в поздний репродуктивный период и период пременопаузы  
С.М. Корниенко .....98

Молекулярно-биологические и генетические индукторы изменения слизистой оболочки эндометрия при наружном генитальном эндометриозе  
[П.Н. Веропотвелян], И.С. Цехмистренко, А.А. Бондаренко, Е.Г. Осадчук, С.А. Журавлева .....103

## БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

Профілактика невдалих спроб застосування допоміжних репродуктивних технологій  
І.Є. Палига .....110

Невиношування вагітності: сучасні погляди на проблему (Огляд літератури)  
І.І. Воробйова, А.А. Живецька-Денисова, В.Б. Ткаченко, Н.В. Рудакова, С.М. Толкач .....113

## ОНКОЛОГИЯ

Опыт применения набуметона у онкогинекологических больных  
С.М. Карташов, Е.М. Олешко .....118

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Наружный акушерский поворот и снижение частоты газовых предлежаний плода  
Green-top Guideline No. 20a, Март 2017 .....123

Продолжительность родов и риск массивного послеродового кровотечения: исследование «случай–контроль»  
Lill Trine Nyfløt, Babill Stray-Pedersen, Lisa Forsen, Siri Vangen .....128

---

Шановні читачі!

**20 квітня ДП «Преса» розпочинає передплату на журнал «Здоровье женщины» на 2 півріччя 2017 року**

Передплату можна оформити за «Каталогом видань України»:

- у відділеннях поштового зв'язку
- в операційних залах поштамтів
- у пунктах приймання передплати
- на сайті ДП «Преса» [www.presa.ua](http://www.presa.ua).

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: **74598**

---