

СОДЕРЖАНИЕ 4 (120)/2017

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- Редкие клинические наблюдения солидной псевдопапиллярной неоплазмы поджелудочной железы у беременных
А.И. Дронов, В.Л. Дронова, Л.А.Рощина,
А.Н.Мокрик11

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

- I Міжнародний конгрес «Репродуктивне здоров'я: мультидисциплінарний підхід у безперервному професійному розвитку лікарів»16
- Тяжелые менструальные кровотечения: современные подходы в диагностике и лечении19

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ

- Эффективность пренатальной диагностики синдрома Дауна в шести областях Центрального и Юго-Восточного регионов Украины
Н.П. Веропотвелян20
- Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників
О.М. Макарчук, Н.І. Матвійків31

В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

- Профілактика репродуктивних втрат при плацентарній дисфункції
Т.В. Герасімова, О.В. Морозова, О.М. Гопчук.....35
- Ретроспективный анализ гестационных осложнений и перинатальных исходов у женщин с дисфункцией щитовидной железы
Ю.П. Вдовиченко, Н.Ф. Алипова.....41
- Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции натуропатическими препаратами
Н.А. Цубанова, А.В. Барская, Т.Д. Губченко47
- Роль клініко-анамнестичних даних у розвитку аденоміозу на сучасному етапі
П.М. Прудніков.....54
- Особенности метаболических и гормональных нарушений у жінок з метаболічним синдромом на прегравідарному етапі
О.А. Диндар57

АКУШЕРСТВО

- Манифестный дефицит железа у беременных: оценка доплерометрических параметров кровотока и феррокинетических показателей на фоне лечения
В.А. Бурлев, Ю.В. Федорова, Т.Н. Сокур,
Н.А. Ильясова62
- Особенности сократительной деятельности матки у рожениц с легкой преэклампсией
Н.В. Аббасова, Э.М. Алиева, В.А. Ахмед-заде,
А.Дж. Исмаилова69
- Маркеры дисфункції ендотелію у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок
В.О. Бенюк, С.Д. Коваль, В.В. Курочка,
Т.В. Ковалюк75
- Антифібринолітична терапія у клініці невинишування вагітності – аспекти лікувальної тактики
В.І. Пирогова, О.О. Ошуркевич78
- Особенности репродуктивного та соматичного анамнезу вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини
А.Л. Костюк83
- Гормональная контрацепция у несовершеннолетних и женщин молодого возраста, взаимосвязь с исходами беременности и родов
П.Н. Веропотвелян, В.В. Радченко, Н.В. Пивнева,
Е.Г. Осадчук.....86
- Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки у пацієнок, що народили нормотрофних дітей з монохоріальною двійні
О.В. Мельник.....94
- Етіопатогенетичні аспекти перебігу I триместра вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій
Л.М. Вигівська, Т.Р. Никонюк98
- ## ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Вміст тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози
В.І. Паньків.....102

флебодіа

600 МГ діосмін

Дві проблеми – одне рішення!

Пролонгована дія



Полегшення симптомів лімфовенозної недостатності^{1,2,3}


біль • тяжкість • трофічні розлади

1 таблетка
на добу

Швидке зменшення симптомів геморою^{3,4,5,6}

біль • набряк • кровотеча

3 таблетки
на добу



Флеботонік та ангіопротектор³

1. R. Barbe Etude de la durée d'action du Diovenor avec contrôle par pléthysmographie, Tribune médicale, 1988, n°270, p49-50.
2. Cazaubon M. et al. Etude comparative d'acceptabilité, d'efficacité et de tolérance de deux formes galéniques de diosmine 600 mg, dans le traitement des symptômes de la maladie veineuse chronique. Angiologie, 2011, vol.63, n°2.
3. SmPC Phlebotonia 600 mg (diosmin). Im-coated tablet.
4. Chauvenet M., Libeskind M. Intérêt de la diosmine d'hémisynthèse dans la poussée hémorroïdaire aiguë. Essai multicentrique randomisé en double insu versus placebo. Rev Fr Gastro-Enterol 1994, 303 : 3-8.
5. Kecmanovic D. et al - The use of Phlebotonia® in the management of bleeding non-prolapsed haemorrhoids. Acta Chirurgica Iugoslavica 2005, 52, 1, 115-116
6. Debien P., Denis J. Traitement des signes fonctionnels de la crise hémorroïdaire aiguë : Essai multicentrique, randomisé, diosmine d'hémisynthèse versus association extrait de Ginkgo biloba-heptaminol troxerutine. Med Chir Dig 1996 ; 25 (5) : 259-64.

Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить діосмін, що відповідає діосміна безводного чистого 600 мг. Фармакотерапевтична група. Ангіопротектори. Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Код АТС C05C A03. Показання для застосування: для полегшення симптомів, обумовлених лімфовенозною недостатністю, таких як відчуття тяжкості у нижніх кінцівках, біль, трофічні розлади; у комплексному лікуванні загострення геморою; як додатковий метод лікування підвищеної ламкості капілярів, порушення мікроциркуляції. Спосіб застосування та дози. Для перорального застосування. При хронічній лімфовенозній недостатності: 1 таблетка на день вранці перед сніданком. Тривалість курсу лікування визначає лікар залежно від перебігу захворювання. Тривалість лікування залежить від показань до застосування та від стадії захворювання. Середня тривалість лікування складає 2 місяці. При гострому геморої: 2-3 таблетки на день під час прийому їжі протягом 7 днів, у разі необхідності, лікування продовжують по 1 таблетці 1 раз на добу до 1 – 2 місяців. Якщо після лікування геморою залишилися симптоми захворювання, необхідно звернутися до проктолога для корекції лікування. Максимальна добова доза – 1800 мг (3 таблетки). Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препарату, особливо у пацієнтів, схильних до алергічних реакцій на кошівий червоний А (E 124). Препарат звичайно не рекомендується застосовувати у період годування груддю. Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж. Рідко можливі диспептичні розлади, головний біль. РП № UA/8590/01/01 Наказ МОЗ № 649 от 26.07.2013.

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

Тотема®

залізо, мідь, марганець

ФРАНЦУЗЬКА ЯКІСТЬ – ЗАЛІЗНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!

- Швидка гематологічна відповідь¹
- Органічні солі заліза, міді та марганцю²
- Можливе застосування під час вагітності²
- Дозволено дітям з 1-го місяця²
- Відповідає рекомендаціям ВООЗ³



тотема Fe²⁺
Mn Cu



¹ С.В. Семочина Клиническая эффективность применения препарата Тотема в лечении железодефицитной анемии у взрослых: гематологический ответ и улучшение качества жизни «Земский врач», № 1, 2012, стр. 37-42.
² Инструкция для медицинского застосування.
³ WHO Model List of Essential Medicines 18th list (April 2013) (Final Amendments – October 2013).

LABORATOIRE
innotech
INTERNATIONAL

Представництво «Лабораторія Іннотек Інтернаціональ» в Україні: 01001, Київ, вул. М.Житомирська, 6, тел. (044) 278 06 38, innotech@innotech.com.ua
Склад лікарського засобу: 1 ампула (10 мл) містить заліза (у вигляді заліза глюконату) 50 мг; марганцю (у вигляді марганцю глюконату) 1,33 мг; міді (у вигляді міді глюконату) 0,7 мг.
Показання для застосування. Залізодефіцитна анемія. Профілактичне лікування залізодефіциту у вагітних жінок, недоношених немовлят, близнюків або дітей, які народжені жінками з дефіцитом заліза. Якщо раціон харчування не містить достатньої кількості заліза. Протипоказання. Надлишок заліза в організмі. Регулярні гемотрансфузії. Одночасне застосування парентеральних форм заліза. Кишкова непрохідність. Залізорефрактерна анемія. Анемія, пов'язана з недостатністю медулярного кровотворення. Гіперчутливість до компонентів препарату. Спадкова непереносимість фруктози. Побічні ефекти. З боку шлунково-кишкового тракту: нудота, печія, закрп, діарея. Можливе тимчасове забарвлення випорознення у чорний колір, що не має клінічного значення та ніяких наслідків для здоров'я. Можлива тимчасова зміна кольору зубної емалі, яка не має ніяких наслідків для здоров'я і зникає після закінчення лікування. Для запобігання такому явищу достатньо розвести розчин препарату у відповідному напої та під час застосування не тримати його довго у роті порожниці. Можливі алергічні реакції (свербіж, висипання, кропив'янка, анафілактична реакція), біль у животі, блювання.
Спосіб застосування та дози. Вміст ампули слід розчинити у простій чи підсопудженій воді або в будь-якому іншому напої, крім чаю, кави, молока та напоїв, що містять алкоголь. Лікування залізодефіцитної анемії: дорослим призначають по 100-200 мг заліза на добу, тобто 2-4 ампули препарату; дітям віком від 1 місяця, препарат призначають із розрахунку 5-10 мг заліза на 1 кг маси тіла на добу. Для лікування залізодефіциту застосовують вдвічі меншу дозу препарату ніж для лікування анемії. Профілактика анемії та залізодефіциту: для профілактики анемії в період вагітності препарат призначають вагітним із розрахунку по 50 мг елементарного заліза (1 ампула) на день протягом другого та третього триместру вагітності, або починаючи з 4-го місяця вагітності. Категорія відпуску. Без рецепта. Реєстраційне посвідчення №UA/7854/01/01 Наказ МОЗ № 752 від 23.08.2013

Матеріал для розповсюдження в рамках спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики та у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників.

СОДЕРЖАНИЕ 4 (120)/2017

ГИНЕКОЛОГИЯ

Використання міфепристону з метою передопераційної підготовки жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки

А.Г. Корнацька, Г.В. Чубей, М.А. Флаксемберг107

Особливості оперативного лікування гінекологічних захворювань лапаротомічним та лапароскопічним доступом у жінок з екстрагенітальною патологією

В.В. Костіков111

Менструальна функція у жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія на тлі гормонотерапії

В.О. Бенюк, В.В. Курочка, С.В. Бенюк, Д.М. Алтібаєва115

Клинико-психологические особенности течения акне у женщин с бесплодием

О.И. Заднипрная118

БЕСПЛОДИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

Оптимізація підходів до розродження жінок, які завагітніли після застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій

Н.П. Гончарук, Н.Р. Ковида.....123

ОНКОЛОГИЯ

Possibility of clinical application of polymorphic variants of the genes ESR1 and CYP2D6*4 in patients with breast and endometrial cancer

O.V. Paliychuk, L.Z. Polishchuk, Z.I. Rossokha127

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Менеджмент тазовых предлежаний плода

Green-top Guideline No. 20b, May 2017134

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Менеджмент беременности с имплантацией в области рубца на матке: отчет о случае

Mini Mammen Roy and Forough Radfar143

Шановні читачі!

**Триває передплата на журнал «Здоровье женщины»
на 2 півріччя 2017 року**

Передплату можна оформити за «Каталогом видань України»:

- у відділеннях поштового зв'язку
- в операційних залах поштамтів
- у пунктах приймання передплати
- на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.

НАШ ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС: 74598
