

# Здоровье женщины

ISSN 1992-5921

№5 (121) '2017

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ  
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
ВЛИЯНИЕ КАТЕГОРИИ  
УРГЕНТНОСТИ КЕСАРЕВА  
СЕЧЕНИЯ НА АДАПТАЦИОННЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ  
И РОЖЕНИЦ** 10

**ПОСТ-РЕЛИЗ  
I МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА  
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ:  
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ  
ПОДХОД В НЕПРЕРЫВНОМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
РАЗВИТИИ ВРАЧЕЙ»** 16

**ГЕСТОЗ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ** 35

**ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОК  
С ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ.  
КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ  
ЛЕЧЕНИЯ** 86

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОТОКОЛЫ:  
МЕНЕДЖМЕНТ НАСЛЕДСТВЕННЫХ  
НАРУШЕНИЙ СВЕРТЫВАЕМОСТИ  
КРОВИ ВО ВРЕМЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ** 102



**Лютеина**  
Микронизованный прогестерон

Сучасні форми мікронізованого  
натурального прогестерону



Ранні та пізні  
терміни<sup>1,2</sup>

**Сублінгвальна форма  
швидкий ефект<sup>1</sup>**

♥ Ефект вже через  
30 хвилин

**Доказова медицина**

**Вагінальна форма  
тривалий ефект<sup>2</sup>**

♥ Ефект протягом 24 годин ♥  
Інноваційна форма 200 мг ♥

**ШВИДКА ТА МАКСИМАЛЬНА БІОДОСТУПНІСТЬ  
ПРИ БУДЬ-ЯКОМУ СПОСОБІ ЗАСТОСУВАННЯ<sup>1</sup>**

**ТАБЛЕТКИ ВАГІНАЛЬНІ №20, 30.** Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг, 100 мг та 200 мг з аплікатором. Показання: лікування порушень, пов'язаних з дефіцитом прогестерону, порушення менструального циклу, болісні менструації, ановуляторні цикли, передменструальний синдром, дисфункціональні маткові кровотечі, ендометриоз матки, безпліддя, звичні і загрозові викидні, недостатність лютеїнової фази передменопаузального періоду, а також у гормональній замісній терапії та у програмі штучного запліднення. Побічні реакції: під час застосування Лютеїни, вживання таблеток, що містять прогестерон, ідентичний ендокринному гормону, побічні ефекти спостерігалися спорадично. В окремих випадках відзначалися сонливість, порушення концентрації уваги, відчуття страху, депресивні стани, головний біль та запаморочення (дивіться повну інструкцію). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, злоякісні пухлини молочних залоз. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/01/01, UA/5244/01/02, UA/5244/01/03.

**ТАБЛЕТКИ СУБЛІНГВАЛЬНІ № 30.** Склад: 1 таблетка містить прогестерону мікронізованого 50 мг. Показання: лікування ендокринного дефіциту прогестерону у формі порушень менструального циклу, вторинної аменореї, ановуляторних циклів, передменструального синдрому, функціональних маткових кровотеч, при штучному заплідненні, безплідді, пов'язаному з лютеїновою недостатністю, звичному невиношуванні та загрози мимовільного абортів при дефіциті прогестерону, недостатності жовтого тіла, вторинній аменореї, запобігання гестрофії ендометрія у жінок, які приймають естрогени (наприклад, при гормональній замісній терапії). Побічні реакції: у поодиноких випадках відзначалися сонливість, порушення концентрації та інші (дивіться повну інструкцію). Протипоказання: підвищена чутливість до компонентів препарату, період годування груддю, підозрювана або підтверджена неоплазія грудей або статевих органів, невизначені кровотечі зі статевих шляхів. Реєстраційне посвідчення: UA/5244/02/01.



Виробник: ТОВ «АДАМЕД», Польща.  
Габельський фармацевтичний завод  
Польща А.Т., Польща, Завис: ТОВ «АДАМЕД»,  
Польща. Представництво в Україні:  
01015, м. Київ, вул. Радичка, 10.  
Тел./факс: (044) 280-57-16, 280-57-54

1. Хоміч Н.В., Мамкур В.И. Клинико-фармакологические особенности современных гестагеновых форм микронизованного прогестерона, применяющихся во время беременности // Здоровье женщины. – 2014. – № 4(90).  
2. Инструкция для медицинского использования препарата Лютеина.

\*Коротка інструкція для медичного застосування препарату Лютеїна. Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Інформація призначена для професійної діяльності фахівців охорони здоров'я.



9 771992 592002 >