

# Здоровье женщины

ISSN 1992-5921

№9 (125) '2017

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ  
С ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
СИНДРОМ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ  
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ  
АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА 10

КРИТИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ  
МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ 27

ДЕСТРУКТИВНО-ХИРУРГИЧЕСКИЕ  
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ  
ШЕЙКИ МАТКИ – ПЛЮСЫ  
И МИНУСЫ 41

ПРОФИЛАКТИКА  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ  
У ЖЕНЩИН С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ  
ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙКИ МАТКИ  
В АНАМНЕЗЕ 59

ВЛИЯНИЕ ПЕРОРАЛЬНОЙ  
И ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  
ЭСТРОГЕНАМИ НА СЕКСУАЛЬНУЮ  
ФУНКЦИЮ В ПЕРИОД РАННЕЙ  
ПОСТМЕНОПАУЗЫ 122



Порушення менструального циклу?

## Циклодинон®



- нормалізує менструальний цикл<sup>1</sup>
- відновлює гормональну рівновагу<sup>2</sup>
- не містить гормонів<sup>3</sup>

Розкриваючи силу рослин

**Циклодинон®. Показання.** Порушення менструального циклу і/або безпліддя пов'язане з недостатністю жовтого тіла. **Застосування.** Препарат приймають по 1 таблетці 1 раз на день. Лікування триває протягом 3 місяців без перерви на час менструації. **Протипоказання.** Не можна застосовувати у випадку підвищеної чутливості до складових компонентів препарату або до будь-якого із допоміжних компонентів препарату. **Особливі застереження.** У випадку виникнення болю або набуття молочних залоз, а також при порушенні менструального циклу рекомендується проконсультуватися з лікарем, оскільки ці симптоми можуть свідчити про захворювання, що потребує медичного дослідження. **Застосування у період вагітності або годування груддю.** Не можна застосовувати у період вагітності або годування груддю (може спричинити зменшення лактації). **Побічні реакції.** Після застосування лікарських засобів, які містять плід прутняку звичайного, повідомлялось про такі симптоми, як головний біль, свербіж або шлунково-кишковий дискомфорт, який проявляється нудотою, болем у ділянці шлунка. Можливі прояви підвищеної чутливості у вигляді висипу, кропив'янки, набряку Квінке, утруднення дихання та колатання.

1. В.Л. Сметник, Л.Б. Бугарева Науковий центр акушерства, гінекології та перинатології РАНІ, Москва. Журнал «Проблеми репродукції», том 11, 5/2005, стр. 50-54

2. W.Wuttke et al 1997. Geb Fra 57, 569-574

3. Інструкція для медичного застосування препарату

**Циклодинон®. Краплі оральні.** Р.п. № UA/0267/01/01 від 23.12.13. **Циклодинон®. Таблетки, вкриті оболонкою.** Р.п. № UA/0267/02/01 від 23.12.13.

**ТОВ «Біонорика»** Україна, вул. Книжний Засток, 9, оф. 392, Київ, 02095. тел.: (044) 521-86-00, факс: (044) 521-86-01, e-mail: info@bionorica.ua.

Для розширення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Матеріал призначений виключно для спеціалістів у галузі охорони здоров'я.



9 771992 592002 >