

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ПОДАГРУ

**©Н. З. Ярема, С. М. Андрейчин, Н. А. Кавецька, Т. Ю. Чернець, Н. А. Бількевич,
М. М. Руда, Б. Г. Бугай, В. О. Лихацька, К. В. Миндзів**

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Подагра – системне тофусне захворювання з відкладенням у різних тканинах кристалів мононатрію урату і розвитком, у зв'язку з цим, запалення в осіб із гіперурикемією, зумовленою зовнішньосекреторними і (або) генетичними чинниками.

Мета дослідження – вивчення функціонального стану гепатобіліарної системи (ГБС) у цих хворих.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 74 пацієнти, серед яких 34 – з хронічним перебігом подагри, 40 – з інтермітуючим. Досліджено частоту та особливості уражень органів ГБС за даними біохімічного дослідження крові та ультразвукового обстеження.

Результати й обговорення. Встановлено, що зі зростанням давності подагри підвищується частота і вираженість уражень ГБС. За даними клініко-інструментального обстеження хворих на подагру, ознаки ураження паренхіми печінки спостерігали в 25 % випадків.

Комплексне дослідження функції печінки виявило, що поряд із гепатомегалією (у 23,8 % ви-

падків) у хворих на подагру часто порушується її функціональний стан. Помірні скарги, які характерні для ураження ГБС, виявляли у 34,6 % хворих. За результатами лабораторних досліджень при подагрі у 37 (50 %) хворих виявлені ознаки, які свідчили про помірні ураження печінки і жовчного міхура.

Встановлено, що зі зростанням давності подагри підвищується частота і вираженість уражень ГБС, значно частіше діагностується ожиріння, які стають чинниками обтяження перебігу подагри, знижують ефективність антиподагричної терапії, сприяють підвищенню частоти загострень та виникненню побічних ефектів від традиційних методів лікування цієї недуги.

Висновок. Враховуючи коморбідність уражень при подагрі з боку ГБС, у комплексну терапію цих хворих потрібно включати метаболічні засоби впливу на функціональний стан печінки.

Перспективи подальших досліджень. Враховуючи отримані результати необхідно продовжити вивчення характеру супутньої патології при подагрі.