

ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРИЙОМІВ ВИРОЩУВАННЯ В УМОВАХ ПІВNЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

А. В. Черенков, доктор сільськогосподарських наук;

О. І. Желязков, С. А. Хорішко, кандидати сільськогосподарських наук;

О. М. Козельський

ДУ Інститут сільського господарства степової зони НААН України

Наведено результати досліджень з впливу технологічних прийомів вирощування на фотосинтез рослин пшениці озимої в умовах північного Степу України. Експериментально доведено, що найбільші показники площин листкової поверхні, фотосинтетичного потенціалу посівів та сумарної кількості хлорофілів "a" і "b" в рослин пшениці були у варіантах з внесенням фонового мінерально-го добрива і наступним підживленням посівів карбамідно-аміачною сумішшю (КАС) у фазі кущення навесні. При вирощуванні по чорному пару вказані показники досягали найбільших значень у сорту Скарбниця, після гороху та соняшнику – у сорту Писанка. Встановлено позитивний кореляційний зв'язок ($r = 0,601–0,638$) між площею листкової поверхні рослин пшениці озимої та урожайністю.

Ключові слова: пшениця озима, попередник, вміст хлорофілів, площа листкової поверхні, фото-синтетичний потенціал посівів.

Фотосинтетична діяльність – основна складова процесу формування вегетативних та генеративних органів у рослин. Інтенсивність фотосинтезу визначається площею асиміляцій-ної поверхні листків, яка в свою чергу залежить від умов вирощування [1, 2]. Дослідники у своїх працях вказують на існування взаємозв'язку між розмірами листкової поверхні та продуктивністю рослин озимини. Сучасні сорти пшениці озимої за сприятливих умов вирощування здатні формувати площу листкової поверхні на рівні 50–60 тис. $m^2/га$, що є оптималь-ним показником для найкращої реалізації продуктивного потенціалу посівів [3, 4]. Зменшення асимілюючої поверхні призводить до зниження урожайності [5].

Проведені вченими розрахунки свідчать, що найсприятливіші умови для формування вро-жаю багатьох сільськогосподарських культур складаються при перевищенні загальною площею листя площин земельної ділянки, зайнятої посівами, у 4–5 разів. Значна площа листкової поверхні сприяє кращому газообміну в посівах та більш повному поглинанню рослинами світла [6]. Проте А. О. Ничипорович стверджував, що занадто велика площа листя (70–80 тис. $m^2/га$) не є корисною, оскільки має місце зниження середньої інтенсивності фотосинтезу [7].

Метою наших досліджень було встановлення параметрів фотосинтетичної діяльності сучасних сортів пшениці озимої (Писанка, Скарбниця, Апогей Луганський) залежно від попередників та рівня мінерального живлення. Згідно зі схемою досліду посіви підживлювали аміачною селітрою та карбамідно-аміачною сумішшю (КАС) у фазі кущення восени і навесні, а також по мерзлотному грунту (МТГ). У фазі колосіння рослини підживлювали позакоренево розчином КАС та карбаміду.

Досліди закладали в 2006–2010 рр. у дослідному господарстві „Дніпро” ДУ Інституту сільського господарства степової зони. Ґрунтovий покрив дослідних ділянок – чорнозем звичайний малогумусний слабоеродований. Вміст загального азоту в орному шарі ґрунту становить 0,17–0,18 %, рухомого фосфору – 125–144 мг/кг, обмінного калію – 69–118 мг/кг абсолютно сухого ґрунту (за Чириковим). Вміст гумусу – 3,1–3,3 %. Дослідження проводили у польовому трифакторному досліді, закладеному методом послідовних ділянок систематичним способом. Площа ділянок дорівнювала: елементарної – 80 m^2 , облікової – 60 m^2 . Повторність – триразова.

Доза внесення мінеральних добрив під передпосівну культивацію (фон) становила: по чорному пару – N₃₀P₃₀K₃₀, після гороху – N₄₅P₄₅K₄₅, соняшнику – N₆₀P₆₀K₆₀. Посівний

КАС у фазі кущення навесні. Так, у середньому за роки досліджень на вказаних вище ділянках найбільшу площа листя по чорному пару сформував сорт Скарбниця, а після гороху та со-няшнику – сорт Писанка. Площа асиміляційної поверхні при цьому становила 58,3; 51,8 та 45,9 тис. м²/га.

Слід зазначити, що при внесенні аміачної селітри на фоні даного рівня мінерального живлення, площа листкової поверхні також була значною. За вирощування озимини по чорному пару найбільша площа листя (56,2 тис. м²/га) сформувалася у посівах сорту Скарбниця, після гороху (49,7 тис. м²/га) та соняшнику (43,9 тис. м²/га) – у сорту Писанка.

Серед сортів мінімальну площу листкової поверхні у фазі колосіння сформували рослини сорту Апогей Луганський.

Порівнюючи асиміляційну площу листкової поверхні пшениці озимої у варіантах з різними рівнями мінерального живлення встановлено, що найменші значення даного показника були у контрольному варіанті без внесення мінеральних добрив. У середньому за роки досліджень площа листя залежно від сорту на ділянках з чорним паром коливалася у межах 42,8–45,6 тис. м²/га, після гороху – 37,1–40,2 тис. м²/га, соняшнику – 34,4–37,0 тис. м²/га.

Структура та оптичні властивості листків, а також вміст хлорофілів у листі впливають на процес поглинання рослинами сонячної енергії. З метою більш глибокого вивчення фотосинтетичної діяльності посівів озимини нами проведено визначення сумарного вмісту хлорофілів “а” і “б” у тканинах рослин і на основі отриманих даних встановлено залежність між цим показником і сортовими особливостями рослин, попередником, рівнем мінерального живлення.

За результатами наших досліджень найвищий вміст хлорофілів виявлено у рослинах пшениці озимої, вирощених по паровому попереднику. Слід відмітити, що більша кількість хлорофілів “а” і “б” по чорному пару була в усі фази розвитку рослин протягом весняно-літньої вегетації. Так, у період весняного кущення у сортів Писанка, Скарбниця, Апогей Луганський залежно від рівня мінерального живлення вміст хлорофілів становив 8,80–9,30; 8,27–10,03; 9,39–9,80 мг/г відповідно. При вирощуванні після гороху значення цього показника досягали відповідно: 7,59–8,50; 8,27–8,78; 8,39–8,55 мг/г, а після соняшнику – 7,59–8,12; 7,96–8,25; 7,90–8,14 мг/г.

Дальший розвиток рослин пшениці супроводжувався поступовим зростанням вмісту хлорофілів “а” і “б”. Найбільші показники сумарної кількості хлорофілів у листках були в фазі колосіння у варіантах з внесенням фонового мінерального добрива і наступним підживленням посівів КАС у фазі кущення навесні. Так, у середньому за роки досліджень при вирощуванні по паровому попереднику сорту Писанка значення вказаного показника становили 12,53 мг/г, а в сортів Скарбниця та Апогей Луганський – 12,57 та 12,47 мг/г відповідно. За вирощування озимини після гороху та соняшнику вміст у листках хлорофілів “а” і “б” у даних варіантах досліду дорівнював 10,85; 10,61; 10,53 та 10,17; 10,07; 9,98 мг/г відповідно сортам (табл. 2).

У ході досліджень встановлено, що при вирощуванні пшениці озимої по паровому попереднику, найбільший вміст хлорофілів був у листках рослин сорту Скарбниця, після непарових попередників – Писанка. Кількість хлорофілів “а” і “б” у листі рослин пшениці озимої сорту Апогей Луганський виявилася найменшою порівняно з рештою сортів.

Встановлено суттєвий вплив рівня мінерального живлення на вміст хлорофілів “а” і “б” у листках рослин. Так, при вирощуванні сорту Апогей Луганський після соняшнику значення даного показника у рослин в фазі колосіння у контрольному варіанті досліду становили 9,62 мг/г. Внесення фонового добрива сприяло зростанню вмісту хлорофілів на 1,3 %, а при додатковому підживленні рослин навесні у фазі кущення КАС – на 3,6 %. У сортів Писанка та Скарбниця приріст вмісту хлорофілів у листках при цьому становив 1,2; 4,1 та 1,4; 4,1 % відповідно.

При вирощуванні озимини по чорному пару різниця за сумарним вмістом

- Дніпропетровськ, 1983. – 46 с.
10. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур / За ред. В. В. Вовкодава. – К., 2001. – 65 с. – (Вип. другий).