

ПРО ДЕЯКІ ЗАСТОСУВАННЯ  $\Delta^\sharp$ -ЗОБРАЖЕННЯ ДІЙСНИХ ЧИСЕЛ

Вказуються застосування  $\Delta^\sharp$ -зображення чисел з  $(0; 1]$ :  $x = \sum_k (-1)^{k-1} 2^{1-a_1-a_2-\dots-a_k} \equiv \Delta^\sharp_{a_1 a_2 \dots a_n \dots}$ , яке є їх кодуванням засобами нескінченного алфавіту  $A = \{1, 2, \dots\}$ , у теорії фрактальної розмірності, у фрактальній геометрії, метричній та ймовірнісній теоріях чисел.

We study the  $\Delta^\sharp$ -representation of numbers belonging to  $(0; 1]$ :  $x = \sum_k (-1)^{k-1} 2^{1-a_1-a_2-\dots-a_k} \equiv \Delta^\sharp_{a_1 a_2 \dots a_n \dots}$ . This is an encoding of numbers by means of infinite alphabet  $A = \{1, 2, \dots\}$ . Its applications in the theory of fractal dimension, fractal geometry, metric and probabilistic theory of numbers are proposed.

**Вступ.** Сьогодні в математиці та її застосуваннях використовують різні моделі дійсного числа (різні системи представлення та зображення дійсних чисел). Це є особливо ефективним при дослідженні різних математичних об'єктів зі складними локальними властивостями і багатими множинами «особливостей». Одні з систем кодування дійсних чисел використовують скінченний, інші — нескінченний алфавіти. Ця робота присвячена найпростішим застосуванням одного з зображень чисел, алфавітом  $A$  якого є множина всіх натуральних чисел.

**Твердження А ([1]).** Для будь-якого числа  $x \in (0; 1]$  існує скінченна або нескінченна послідовність натуральних чисел  $(a_n)$ , така, що

$$x = \sum_k (-1)^{k-1} 2^{1-a_1-\dots-a_k} \equiv \Delta^\sharp_{a_1 \dots a_n \dots}. \quad (1)$$

Подання числа  $x$  у вигляді суми (1) називається його  $\Delta^\sharp$ -представленням, а символічний запис  $\Delta^\sharp_{a_1 \dots a_n \dots}$  у випадку нескінченної суми (1) та  $\Delta^\sharp_{a_1 \dots a_n(0)}$  у випадку скінченного розкладу називається  $\Delta^\sharp$ -зображенням цього числа. При цьому число (і символ алфавіту  $A$ )  $a_n = a_n(x)$  називається  $n$ -ою цифрою (символом) цього зображення.

**Твердження В ([1]).** Для того щоб число  $x \in (0, 1]$  було раціональним, необхідно і достатньо, щоб його  $\Delta^\sharp$ -зображення було скінченним або періодичним.

**Твердження С ([1]).** При довільних на-

туральному  $n$  і наборі натуральних чисел  $(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n)$  число

$$x = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} 2^{1-a_1-a_2-\dots-a_k} \equiv \Delta^\sharp_{a_1 a_2 \dots a_{n-1} a_n(0)} \quad (2)$$

є раціональним числом з півінтервалу  $(0; 2^{1-a_1}]$ , причому, якщо  $a_n = 1$ , то

$$x = 2^{1-a_1} - 2^{1-a_1-a_2} + \dots + (-1)^{n-2} 2^{1-a_1-a_2-\dots-a_{n-2}-a'_{n-1}} \equiv \Delta^\sharp_{a_1 a_2 \dots a_{n-2} a'_{n-1}(0)}, \quad (3)$$

де  $a'_{n-1} = a_{n-1} + 1$ .

Число  $x$  називається  $\Delta^\sharp$ -раціональним, якщо його  $\Delta^\sharp$ -зображення є скінченним.

Отже, згідно з твердженням С  $\Delta^\sharp$ -раціональне число має два  $\Delta^\sharp$ -зображення і є раціональним числом. Таким чином,  $\Delta^\sharp$ -раціональні числа утворюють зліченну підмножину множини раціональних чисел, а доповнення першої до другої — це множина чисел, що мають періодичні  $\Delta^\sharp$ -зображення. Для  $\Delta^\sharp$ -ірраціональних чисел  $k$ -та цифра  $\Delta^\sharp$ -зображення числа є функцією числа, що розкладається (розгортається) в ряд (1).

Представлення числа у формі (1) уперше фігурувало у роботі Г. Мінковського [2] у виразі значення сингулярної строго зростаючої функції (сьогодні так званої функції Мінковського (див., наприклад, [3–7])), яка

в ірраціональних точках відрізка  $[0; 1]$  виражається рівністю:

$$\begin{aligned} ?(x) &= ?([0; a_1, a_2, \dots, a_n, \dots]) = \\ &= 2^{1-a_1} - 2^{1-a_1-a_2} + 2^{1-a_1-a_2-a_3} + \dots + \\ &\quad + (-1)^{n+1} 2^{1-a_1-\dots-a_n} + \dots, \end{aligned}$$

де  $x = \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}}$   $\equiv [0; a_1, a_2, \dots, a_n, \dots]$ —

а в раціональних точках доозначається за неперервністю і виражається скінченною сумою.

**1. Задача, яка приводить до поняття  $\Delta^\#$ -зображення.** Розглядається випадкова величина  $\xi$ , представлена елементарним ланцюговим дробом:

$$\xi = [0; \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_m, \dots]$$

елементи  $\eta_n$  якого утворюють послідовність незалежних однаково розподілених випадкових величин, які набувають значень  $1, 2, 3, \dots, k, \dots$  з ймовірностями  $\frac{1}{2^1}, \frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \dots, \frac{1}{2^k}, \dots$  відповідно. Знайдемо вираз функції розподілу  $F_\xi$  випадкової величини  $\xi$ . Оскільки згідно з означенням

$$F_\xi(x) = P\{\xi < x\},$$

то проаналізуємо подію  $\{\xi < x\}$  і виразимо її ймовірність.

Враховуючи геометрію ланцюгового представлення (зображення) чисел, маємо

$$\{\xi < x\} = \{\eta_1 > a_1(x)\} \cup$$

$$\cup \{\eta_1 = a_1(x) \wedge \eta_2 < a_2(x)\} \cup \dots$$

$$\cup \{\eta_i = a_i(x),$$

$$\text{при } i = \overline{1, 2k-1} \wedge \eta_{2k} < a_{2k}(x)\} \cup$$

$$\cup \{\eta_i = a_i(x),$$

$$\text{при } i = \overline{1, 2k} \wedge \eta_{2k+1} > a_{2k+1}(x)\} \cup \dots,$$

де події в правій частині рівності попарно несумісні.

Враховуючи незалежність випадкових величин  $\eta_n$ , знайдемо вирази ймовірностей

подій, які беруть участь в останньому об'єднанні:

$$\begin{aligned} P\{\eta_1 > a_1(x)\} &= \sum_{n=1}^{\infty} P\{\eta_1 = a_1(x) + n\} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{a_1+n}} = \frac{1}{2^{a_1}}; \\ P\{\eta_i &= a_i(x), \end{aligned}$$

$$\text{при } i = \overline{1, 2k-1} \wedge \eta_{2k} < a_{2k}(x)\} =$$

$$= \prod_{i=1}^{2k-1} P\{\eta_i = a_i(x)\} \cdot \sum_{j=1}^{a_{2k}(x)-1} P\{\eta_{2k} = j\} =$$

$$= \prod_{i=1}^{2k-1} \frac{1}{2^{a_i(x)}} \cdot \sum_{j=1}^{a_{2k}(x)-1} \frac{1}{2^j} =$$

$$= \frac{1}{2^{a_1+a_2+\dots+a_{2k-1}}} - \frac{1}{2^{a_1+a_2+\dots+a_{2k-1}}};$$

$$P\{\eta_i = a_i(x),$$

$$\text{при } i = \overline{1, 2k} \wedge \eta_{2k+1} > a_{2k+1}(x)\} =$$

$$= \prod_{i=1}^{2k} P\{\eta_i = a_i(x)\} \times$$

$$\times \sum_{j=a_{2k+1}(x)+1}^{\infty} P\{\eta_{2k+1} = j\} =$$

$$= \left( \prod_{i=1}^{2k} \frac{1}{2^{a_i(x)}} \right) \cdot \frac{1}{2^{a_{2k+1}}} =$$

$$= \frac{1}{2^{a_1+a_2+\dots+a_{2k}+a_{2k+1}}}.$$

Тоді

$$P\{\xi < x\} = \frac{1}{2^{a_1}} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[ \frac{1}{2^{a_1+a_2+\dots+a_{2k-1}}} - \right.$$

$$\left. \frac{1}{2^{a_1+a_2+\dots+a_{2k-1}}} + \frac{1}{2^{a_1+a_2+\dots+a_{2k}+a_{2k+1}}} \right] =$$

$$= \frac{1}{2^{a_1-1}} - \frac{1}{2^{a_1+a_2-1}} + \frac{1}{2^{a_1+a_2+a_3-1}} - \dots +$$

$$+ \frac{(-1)^{k-1}}{2^{a_1+a_2+\dots+a_k-1}} + \dots = F_\xi(x).$$

*Зауваження.* Вираз значення функції розподілу  $F_\xi(x)$  в ірраціональній точці  $x$  інтервалу  $(0; 1)$  є  $\Delta^\#$ -представленням. Оскільки розподіл випадкової величини  $\xi$  є неперервним, то  $F_\xi(x)$  є неперервною функцією, значення якої в раціональних точках теж має відповідне  $\Delta^\#$ -зображення.

**2. Геометрія  $\Delta^\#$ -зображення: циліндри та їхні властивості.** Під *геометрією зображення дійсного числа* [8, с. 190] ми розуміємо геометричний зміст цифр та метричні співвідношення, ним породжені, які індукують тополого-метричні та фрактальні властивості множин чисел, визначених умовами на використання цифр (наприклад, заборонами вживати символи алфавіту або їх комбінації). Це відносно нова галузь досліджень, яка продиктована в першу чергу потребами, задачами та проблемами теорії фракталів (фрактальної геометрії та фрактального аналізу), усвідомленою необхідністю дослідження математичних об'єктів з просторово-неоднорідною локальною структурою.

Центральними поняттями геометрії  $\Delta^\#$ -зображення дійсних чисел є поняття циліндра, напівциліндра, хвостової множини [1].

**Означення.** Нехай  $(c_1, c_2, \dots, c_m)$  — впорядкований набір натуральних чисел.

*Циліндром рангу  $m$  з основою  $c_1c_2 \dots c_m$*  називається множина  $\Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m}$  всіх чисел  $x \in (0, 1]$ , які мають  $\Delta^\#$ -зображення таке, що

$$a_i(x) = c_i, \quad i = \overline{1, m}.$$

Внутрішність множини (циліндра)  $\Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m}$  позначатимемо через  $\nabla^\#_{c_1c_2 \dots c_m}$ .

Циліндри мають наступні властивості [1].

- $\bigcup_{c_1=1}^{\infty} \bigcup_{c_2=1}^{\infty} \dots \bigcup_{c_m=1}^{\infty} \Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m} = (0, 1]$ ,  
для будь-якого натурального  $m$ ;
- $\Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m i}$ ;
- $\inf \Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_{2k-1} i} = \sup \Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_{2k-1} (i+1)}$ ;  
 $\sup \Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_{2k} i} = \inf \Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_{2k} (i+1)}$ ;

4. Циліндр  $\Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m}$  є відрізком, причому

$$\Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m} = [a - \delta; a], \quad \text{коли } m = 2k - 1, \text{ і}$$

$$\Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m} = [a; a + \delta], \quad \text{коли } m = 2k,$$

$$\text{де } \delta = 2^{-c_1 - c_2 - \dots - c_m},$$

$$a = \sum_{i=1}^m (-1)^{i-1} 2^{1-c_1 - c_2 - \dots - c_i};$$

5. Циліндри одного рангу не перетинаються або співпадають (рівні), причому

$$\Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m} = \Delta^\#_{c'_1c'_2 \dots c'_m} \Leftrightarrow c_i = c'_i \quad i = \overline{1, m};$$

6. Для довільної послідовності  $(c_m)$ ,  $c_m \in \mathbb{N}$ , переріз

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} \Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m} = x \equiv \Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m \dots}$$

є точкою півінтервала  $(0; 1]$ .

7. Для довжини циліндра рангу  $m$  мають місце співвідношення

$$|\Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m}| = \frac{1}{2^{c_1 + c_2 + \dots + c_m}} \leq \frac{1}{2^m} \rightarrow 0$$

при  $m \rightarrow \infty$ .

8. Основне метричне відношення (наслідок властивості 7):

$$\frac{|\Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m i}|}{|\Delta^\#_{c_1c_2 \dots c_m}|} = \frac{1}{2^i}.$$

Вкажемо кілька застосувань геометрії  $\Delta^\#$ -зображення чисел.

### 3. Фрактальна розмірність Гаусдорфа-Безиковича і $\Delta^\#$ -циліндри.

Нагадаємо деякі теоретичні відомості з теорії фракталів [9, с. 53–56], які ми будемо використовувати далі.

*Діаметр*  $d(E)$  множини  $E \subset \mathbb{R}^1$  означається рівністю

$$d(E) \equiv \sup_{x, y \in E} |x - y|.$$

Нехай  $\Phi$  — така система підмножин простору  $\mathbb{R}^1$ , що для довільної підмножини  $E \subset \mathbb{R}^1$

і для довільного  $\varepsilon > 0$  існує не більш ніж зліченне  $\varepsilon$ -покриття  $\{E_j\}$  множини  $E$ :

$$E \subseteq \bigcup_j E_j, \quad E_j \in \Phi, \quad d(E_j) \leq \varepsilon.$$

Для заданої обмеженої множини  $E \subset \mathbb{R}^1$ , довільних  $\alpha > 0$  і  $\varepsilon > 0$  означимо величину

$$m_\varepsilon^\alpha(E, \Phi) = \inf_{d(E_j) \leq \varepsilon} \left\{ \sum_j d^\alpha(E_j) \right\},$$

де інфімум береться за всіма не більш ніж зліченими  $\varepsilon$ -покриттями  $\{E_j\}$  множини  $E$  множинами  $E_j \in \Phi$ .

**Означення.** Невід'ємне число або нескінченність

$$H^\alpha(E, \Phi) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} m_\varepsilon^\alpha(E, \Phi) = \sup_{\varepsilon > 0} m_\varepsilon^\alpha(E, \Phi)$$

називається  $\alpha$ -мірною мірою Гаусдорфа (або  $H^\alpha$ -мірою Гаусдорфа) обмеженої множини  $E \subset \mathbb{R}^1$  відносно сім'ї покриттів  $\Phi$ .

Міра Гаусдорфа має властивості:

- 1)  $H^\alpha\left(\bigcup_i E_i, \Phi\right) \leq \sum_i H^\alpha(E_i, \Phi)$ ;
- 2) Якщо  $\alpha_1 < \alpha_2$ , то  $H^{\alpha_1}(E, \Phi) \geq H^{\alpha_2}(E, \Phi)$ ;
- 3) Якщо  $H^{\alpha_1}(E, \Phi) = 0$ , то  $H^{\alpha_2}(E, \Phi) = 0$  при  $\alpha_1 < \alpha_2$ ;
- 4) Якщо  $H^{\alpha_2}(E, \Phi) = \infty$ , то  $H^{\alpha_1}(E, \Phi) = \infty$  при  $0 < \alpha_1 < \alpha_2$ .

**Означення.** Невід'ємне число

$$\alpha_0(E, \Phi) = \sup\{\alpha : H^\alpha(E, \Phi) = +\infty\} = \inf\{\alpha : H^\alpha(E, \Phi) = 0\}$$

називається розмірністю Гаусдорфа–Безиковича множини  $E$  відносно сім'ї покриттів  $\Phi$ .

Зауважимо, що розмірність Гаусдорфа–Безиковича для множини з  $\mathbb{R}^1$  може набувати всіх значень з  $[0; 1]$  і має наступні властивості.

- 1)  $\alpha_0(E, \Phi) = 0$  для довільної не більш ніж зліченної множини  $E$ .
- 2)  $\alpha_0(E_1, \Phi) \leq \alpha_0(E_2, \Phi)$ , якщо  $E_1 \subset E_2$ .

$$3) \alpha_0\left(\bigcup_n E_n, \Phi\right) = \sup_n \alpha_0(E_n, \Phi).$$

4) Якщо  $E_1$  і  $E_2$  — геометрично подібні множини, то  $\alpha_0(E_1, \Phi) = \alpha_0(E_2, \Phi)$ .

5) Якщо  $\Phi_1$  — ширший клас множин, ніж  $\Phi_2$ , то  $\alpha_0(E, \Phi_1) \leq \alpha_0(E, \Phi_2)$ .

Якщо  $\Phi$  — сім'я всіх інтервалів або відрізків, то  $\alpha_0(E, \Phi)$  ми позначаємо через  $\alpha_0(E)$  і називаємо просто розмірністю Гаусдорфа–Безиковича.

Однією з традиційних задач теорії розмірності Гаусдорфа–Безиковича є задача [10–12] про те, чи достатньо класу множин  $\Phi$  для того, щоб  $\alpha_0(E, \Phi) = \alpha_0(E)$ .

Нехай  $W$  — клас усіх зв'язних множин, що є об'єднаннями циліндрів однакового рангу, які належать одному і тому ж циліндру попереднього рангу, тобто множин вигляду

$$(1) \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m}^\#, \quad (2) \bigcup_{i=n}^{\infty} \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m i}^\#,$$

$$(3) \bigcup_{i=1}^n \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m i}^\#, \quad (4) \bigcup_{i=k}^n \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m i}^\#$$

для всіх  $k, m, n \in \mathbb{N}$  і наборів натуральних чисел  $(c_1, c_2, \dots, c_m)$ .

Позначимо через  $W_\varepsilon$  клас множин з  $W$ , діаметри яких не перевищують  $\varepsilon$ .

**Лема 2.** Для довільного інтервалу  $u \subset (0, 1]$  існує не більше чотирьох множин з  $W_{|u|}$ , які покривають  $u$  і мають діаметри не більші за  $|u|$ .

**Доведення.** Нехай  $u = (a, b)$ . Точки  $a$  і  $b$  можуть належати: 1) різним циліндрам 1-го рангу; 2) одному циліндру 1-го рангу.

1. Нехай  $a \in \Delta_{a_1}^\#, b \in \Delta_{b_1}^\#, c = \max \Delta_{a_1}^\#, d = \min \Delta_{b_1}^\#$ . Оскільки  $a < b$ , то  $a_1 > b_1$  і  $a < d < b$ .

Можливі підвипадки: 1)  $a_1 - b_1 > 1$  і 2)  $a_1 - b_1 = 1$ .

1.1. Нехай  $a_1 - b_1 > 1$ . Тоді

$$(a, b) = (a, d] \cup (d, b).$$

Якщо  $a = \min \Delta_{a_1}^\#$ , то

$$[a, d] = \bigcup_{i=b_1+1}^{a_1} \Delta_i^\# \subset W_{d-a} \subset W_{b-a}.$$

Якщо  $a \in \nabla_{a_1}^\#$ , то  $(a, d)$  покривається двома множинами з  $W_{d-a}$ , а саме:

$$\Delta_{a_1}^\# \quad \text{і} \quad \bigcup_{j=b_1+1}^{a_1-1} \Delta_j^\#.$$

Таким чином, для покриття  $[a, d]$  достатньо двох множин з  $W_{d-a}$ , а отже, і з  $W_{b-a}$ . Розглянемо  $[d, b]$ . Якщо  $b = \max \Delta_{b_1}^\#$ , то

$$[d, b] = \Delta_{b_1}^\# \subset W_{b-d} \subset W_{b-a}.$$

Якщо  $b \in \nabla_{b_1}^\#$ , то розглянемо циліндри 2-го рангу  $\Delta_{b_1j}^\#$ , які належать  $\Delta_{b_1}^\#$ .

Якщо  $b = \max \Delta_{b_1n}^\#$ , то

$$[d, b] = \bigcup_{j=1}^n \Delta_{b_1j}^\# \subset W_{b-d}.$$

Якщо  $b \in \nabla_{b_1n}^\#$ , то  $[d, b]$  покривають:

а) дві множини з  $W_{b-a}$ :

$$\bigcup_{j=1}^{n-1} \Delta_{b_1j}^\# \quad \text{і} \quad \Delta_{b_1n}^\#, \quad \text{якщо } n > 1,$$

б) одна множина  $\Delta_{b_11}^\#$ , якщо  $n = 1$ , оскільки

$$|\Delta_{b_11}^\#| < |\Delta_{b_1+1}^\#|, \quad \Delta_{b_1+1}^\# \subset [a, b].$$

Отже, для покриття  $[d, b]$  досить двох множин з  $W_{b-a}$  і не більше чотирьох множин для покриття  $[a, b]$ .

1.2. Нехай  $a_1 - b_1 = 1$ . Тоді  $c = d$ ,  $a \in \nabla_{a_1}^\#$ .

Розглянемо  $[a, d]$ . Якщо  $a = \min \Delta_{a_1k}^\#$ , то

$$[a, d] = \bigcup_{j=k}^{\infty} \Delta_{a_1j}^\# \subset W_{d-a} \subset W_{b-a}.$$

Якщо  $a \in \nabla_{a_1k}^\#$ , то  $[a, d]$  покривається двома множинами з  $W_{b-a}$ , а саме:

$$\Delta_{a_1k}^\# \quad \text{і} \quad \bigcup_{j=k+1}^{\infty} \Delta_{a_1j}^\#,$$

оскільки згідно з рівністю

$$|\Delta_{c_1c_2\dots c_ms}^\#| = \sum_{j=s+1}^{\infty} |\Delta_{c_1c_2\dots c_mj}^\#|$$

$$\text{маємо } |\Delta_{a_1k}^\#| = \sum_{j=k+1}^{\infty} |\Delta_{a_1j}^\#|.$$

Отже, для покриття  $[a, d]$  досить двох множин з  $W_{b-a}$ .

Тепер розглянемо  $[d, b]$ .

Якщо  $b = \max \Delta_{b_1n}^\#$ , то

$$[d, b] = \bigcup_{j=1}^n \Delta_{b_1j}^\# \subset W_{b-d}.$$

Якщо  $b \in \nabla_{b_1n}^\#$  і  $n > 1$ , то  $[d, b]$  покривається двома множинами з  $W_{b-a}$ , а саме:

$$\bigcup_{j=1}^{n-1} \Delta_{b_1j}^\# \quad \text{і} \quad \Delta_{b_1n}^\#,$$

оскільки  $|\Delta_{b_1n}^\#| < |\Delta_{b_1+1}^\#|$ ,  $\Delta_{b_1+1}^\# \subset [d, b]$ .

Якщо ж  $b \in \nabla_{b_11}^\#$ , то розглянемо циліндри  $\Delta_{b_11j}^\#$  3-го рангу, які належать  $\Delta_{b_11}^\#$ . В цьому випадку  $[d, b]$  покривається не більше ніж двома множинами з  $W_{b-a}$ , а саме:

а) якщо  $b = \max \Delta_{b_11s}^\#$ , то однією множиною:

$$\bigcup_{j=s}^{\infty} \Delta_{b_11j}^\#,$$

б) якщо  $b \in \nabla_{b_11s}^\#$ , то двома множинами:

$$\bigcup_{j=s+1}^{\infty} \Delta_{b_11j}^\# \quad \text{і} \quad \Delta_{b_11s}^\#,$$

оскільки довжина останньої є меншою діаметра першої. Отже, для покриття  $[d, b]$  досить двох множин з  $W_{b-a}$  і чотирьох множин для покриття всього  $[a, b]$ .

2. Якщо  $a$  і  $b$  належать одному циліндру 1-го рангу, то існує циліндр  $\Delta_{c_1c_2\dots c_m}^\#$  деякого рангу  $m$ , якому належать числа  $a$  і  $b$ , але не існує циліндра рангу  $m + 1$ , якому б вони належали.

У випадку, коли  $m$  парне, для доведення лему досить повторити міркування випадку 1, де роль  $(0, 1]$  буде відігравати циліндр  $\Delta_{c_1c_2\dots c_m}^\#$ .

Якщо ж  $m$  — число непарне, дійти до висновку можна аналогічними міркуваннями. При цьому числа  $a$  і  $b$ ,  $c$  і  $d$  обмінюються ролями. Лему 2 доведено.

**Теорема 3.** Класу множин  $W$  достатньо для визначення розмірності Гаусдорфа–Безиковича довільної борелівської множини  $E \subset [0, 1]$ , тобто

$$\alpha_0(E, W) = \alpha_0(E). \quad (4)$$

**Доведення.** З леми 2 випливає

$$m_\varepsilon^\alpha(E, W) \leq 4m_\varepsilon^\alpha(E).$$

Справді, для довільного відрізка  $u$ , що бере участь в покритті  $E$ , існує не більше чотирьох множин  $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4 \in W$ , для яких

$$|\omega_i|^\alpha \leq |u|^\alpha \quad \text{при довільному } \alpha \in (0, 1).$$

З іншого боку,

$$m_\varepsilon^\alpha(E) \leq m_\varepsilon^\alpha(E, W),$$

оскільки у визначенні  $m_\varepsilon^\alpha(E)$  інфімум береться за ширшим класом покриттів, який включає і множини з  $W$ . Таким чином,

$$m_\varepsilon^\alpha(E) \leq m_\varepsilon^\alpha(E, W) \leq 4m_\varepsilon^\alpha(E)$$

для будь-якого  $\varepsilon > 0$ . Звідки перехід до границь дає

$$H^\alpha(E) \leq H^\alpha(E, W) \leq 4H^\alpha(E),$$

тобто  $H^\alpha(E)$  і  $H^\alpha(E, W)$  одночасно по  $\alpha$  набувають значень 0 та  $\infty$ . А це означає, що має місце рівність 4. Теорему 3 доведено.

#### 4. Метричні задачі: фрактали канторівського типу.

З виразу довжини циліндра і формул для геометричної прогресії випливає наступне твердження.

**Лема 3.** Для міри Лебега  $\lambda$  мають місце наступні рівності:

$$\begin{aligned} 1. \lambda \left( \bigcup_{i=1}^k \Delta_{c_1 \dots c_m i} \right) &= \left( 1 - \frac{1}{2^k} \right) |\Delta_{c_1 \dots c_m}^\#| = \\ &= \left( 1 - \frac{1}{2^k} \right) \frac{1}{2^{c_1 + c_2 + \dots + c_m}}; \\ 2. \lambda \left( \bigcup_{i=k+1}^{\infty} \Delta_{c_1 \dots c_m i} \right) &= \frac{1}{2^k} |\Delta_{c_1 \dots c_m}^\#| = \\ &= \frac{1}{2^k} \frac{1}{2^{c_1 + c_2 + \dots + c_m}}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \lambda \left( \bigcup_{i=k+1}^n \Delta_{c_1 \dots c_m i} \right) &= \left( 1 - \frac{1}{2^{n-k}} \right) |\Delta_{c_1 \dots c_m}^\#| = \\ &= \left( 1 - \frac{1}{2^{n-k}} \right) \frac{1}{2^{c_1 + c_2 + \dots + c_m}}. \end{aligned}$$

**Теорема 4.** Множина  $C \equiv C[\Delta^\#, V] = \{x : x = \Delta_{a_1 a_2 \dots a_n}^\#, a_n \in V \neq N\}$  є:

- 1) досконала;
- 2) ніде не щільна;
- 3) має нульову міру Лебега;
- 4) самоподібна, якщо  $V$  – скінченна множина, і  $N$ -самоподібна, якщо  $V$  – нескінченна множина, її фрактальна розмірність Гаусдорфа–Безиковича є розв'язком рівняння

$$\sum_{v \in V} \left( \frac{1}{2^v} \right)^x = 1.$$

**Доведення.** 1. Нехай  $x_0 = \Delta_{c_1 \dots c_n}^\#$  – гранична точка множини  $C$ , тобто така, що для будь-якого  $\varepsilon > 0$  інтервал  $(x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon)$  містить нескінченну кількість точок множини  $C$ .

Доведемо, що  $x_0 \in C[\Delta^\#, V]$ , тобто покажемо, що всі  $c_j$  належать  $V$ ,  $j \in \mathbb{N}$ . Припустимо, що це не так, тобто існує  $c_i \in \mathbb{N} \setminus V$ . Тоді  $x_0 \in \Delta_{c_1 \dots c_{i-1} c_i}^\#$ . Але  $\Delta_{c_1 \dots c_{i-1} c_i}^\# \cap C = \emptyset$  і тому  $(x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \cap C = \emptyset$  при  $\varepsilon < \frac{1}{2^{i+1}}$ , що суперечить тому, що  $x_0$  є граничною для  $C$ . Тобто всі  $c_j \in V$  і  $x_0 \in C$ . Отже,  $C$  є замкненою множиною.

Тепер покажемо, що  $C$  не містить ізольованих точок. Припустимо супротивне. Нехай  $x_1 = \Delta_{c_1 \dots c_n}^\#$  – ізольована точка множини  $C$  ( $c_j \in V$ ), тобто існує  $\varepsilon > 0$  таке, що

$$(x_1 - \varepsilon; x_1) \cap C = \emptyset = C \cap (x_1; x_1 + \varepsilon).$$

Але, взявши  $m$  достатньо великим, а саме:  $\frac{1}{2^{c_1 + c_2 + \dots + c_m}} < \varepsilon$ , матимемо

$$\Delta_{c_1 \dots c_m}^\# \subset (x_1 - \varepsilon; x_1 + \varepsilon).$$

Тоді точка

$$x_2 = \Delta_{c_1 \dots c_m i(v)}^\# \in C \cap (x_1 - \varepsilon; x_1 + \varepsilon),$$

де  $i \in V \setminus \{c_{m+1}\}$ ,  $v \in V$ , що суперечить припущенню, оскільки  $x_2 \neq x_1$ .

Таким чином, множина  $C$  є замкненою і не містить ізольованих точок, тобто є досконалою.

2. Скористаємось означенням ніде не щільної множини. Для цього покажемо, що для довільного інтервалу  $(a, b) \subseteq (0, 1)$  існує підінтервал  $(a', b') \subseteq (a, b)$ , який не містить точок множини  $C$ . Не порушуючи загальності, можна вважати, що числа  $a$  і  $b$  мають нескінченні зображення. Нехай

$$a = \Delta_{c_1 \dots c_{m-1} c_m c_{m+1} \dots}^{\sharp}, \quad b = \Delta_{c'_1 \dots c'_{m-1} c'_m c'_{m+1} \dots}^{\sharp},$$

де  $c_m \neq c'_m$ .

1) Якщо  $m$  — число непарне, то  $c_m > c'_m$  і  $c_j = c'_j$  при  $j < m$ . Тоді

$$(a', b') = \nabla_{c_1 \dots c_{m-1} c_m [c_{m+1}+1] j},$$

де  $j \in \mathbb{N} \setminus V$ .

2) Якщо ж  $m$  — парне, то  $c_m < c'_m$  і  $c_j = c'_j$  при  $j < m$ . І тоді

$$(a', b') = \nabla_{c_1 \dots c_{m-1} c'_m [c'_{m+1}+1] j},$$

де  $j \in \mathbb{N} \setminus V$ .

3. Якщо  $V_1 \subseteq V_2$ , то очевидно, що  $C[\Delta^{\sharp}, V_1] \subset C[\Delta^{\sharp}, V_2]$ . Тоді міркування досить провести для випадку, коли множина  $\mathbb{N} \setminus V = \{u\}$  складається з одного елемента.

Нехай  $F_k$  — це об'єднання всіх циліндрів  $k$ -го рангу, серед внутрішніх точок яких є точки множини  $C$ . Тоді  $C \subset F_{k+1} \subset F_k$ . А отже,

$$\lambda(C) \leq \lambda(F_k) \quad \text{для всіх } k \in \mathbb{N}.$$

Оскільки

$$\begin{aligned} F_k &= \bigcup_{i_1 \neq u} \bigcup_{i_2 \neq u} \dots \bigcup_{i_k \neq u} \Delta_{i_1 i_2 \dots i_k}, \text{ то} \\ \lambda(F_k) &= \sum_{i_1 \neq u} \sum_{i_2 \neq u} \dots \sum_{i_k \neq u} |\Delta_{i_1 i_2 \dots i_k}| = \\ &= \sum_{i_1 \neq u} \sum_{i_2 \neq u} \dots \sum_{i_{k-1} \neq u} |\Delta_{i_1 i_2 \dots i_{k-1}}| \sum_{i_k \neq u} \frac{1}{2^{i_k}} = \\ &= \left(1 - \frac{1}{2^u}\right) \sum_{i_1 \neq u} \sum_{i_2 \neq u} \dots \sum_{i_{k-1} \neq u} |\Delta_{i_1 i_2 \dots i_{k-1}}| = \\ &= \left(1 - \frac{1}{2^u}\right) \sum_{i_1 \neq u} \dots \sum_{i_{k-2} \neq u} |\Delta_{i_1 \dots i_{k-2}}| \sum_{i_{k-1} \neq u} \frac{1}{2^{i_{k-1}}} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \left(1 - \frac{1}{2^u}\right)^2 \sum_{i_1 \neq u} \dots \sum_{i_{k-2} \neq u} |\Delta_{i_1 \dots i_{k-2}}| = \dots = \\ &= \left(1 - \frac{1}{2^u}\right)^{k-1} \sum_{i_1 \neq u} |\Delta_{i_1}| = \\ &= \left(1 - \frac{1}{2^u}\right)^{k-1} \sum_{i_1 \neq u} \frac{1}{2^{i_1}} = \left(1 - \frac{1}{2^u}\right)^k. \end{aligned}$$

Тоді  $\lambda(C) \leq \lambda(F_k) = \left(1 - \frac{1}{2^u}\right)^k \rightarrow 0$ , коли  $k \rightarrow \infty$ . А отже,  $\lambda(C) = 0$ .

4. Оскільки

$$C = \bigcup_n C_n \text{ і } C \stackrel{2^{-c_n}}{\sim} C_n = \Delta_{c_n}^{\sharp} \cap C,$$

то множина  $C$  є самоподібною у випадку скінченного об'єднання і  $N$ -самоподібною, якщо  $n \rightarrow \infty$ . Її самоподібна ( $N$ -самоподібна) розмірність набуває значень з нескінченної множини і є розв'язком рівняння

$$\sum_{c_n \in V} \left(\frac{1}{2^{c_n}}\right)^x = 1.$$

Теорему 4 доведено.

**Наслідок 1.** Якщо  $V = \mathbb{N} \setminus \{1\}$ , то  $\alpha_0(C) = \log_2 \frac{2}{\sqrt{5}-1}$ .

**Теорема 5.** Нехай  $s$  і  $s$  — фіксовані натуральні числа. Множина

$$C \equiv C[\Delta^{\sharp}, \overline{cs}] =$$

$$= \{x : x = \Delta_{a_1 \dots a_n}^{\sharp}, \text{ де } \overline{a_n a_{n+1}} \neq \overline{cs} \forall n \in \mathbb{N}\}$$

є ніде не щільною множиною нульової міри Лебега.

**Доведення.** Доведемо, що  $C[\Delta^{\sharp}, \overline{cs}]$  є ніде не щільною множиною згідно з означенням.

Нехай  $(a, b)$  — довільний інтервал, що належить  $(0, 1]$ . Легко вказати циліндр  $\Delta_{c_1 \dots c_m}^{\sharp} \subseteq (a, b)$ .

Справді, оскільки  $a < b$ , то існує  $k$  таке, що  $a_k(a) \neq a_k(b)$ , але  $a_i(a) = a_i(b)$  при  $i < k$ . Тоді можливі випадки: 1)  $k$  — непарне; 2)  $k$  — парне.

1)  $\Delta_{a_1(a) \dots a_k(a) [a_{k+1}(a)+1]}^{\sharp} \subseteq (a, b)$ , а

$$\Delta_{a_1(a) \dots a_k(a)[a_{k+1}(a)+1]cs}^\# \cap C = \emptyset.$$

$$2) \Delta_{a_1(b) \dots a_k(b)[a_{k+1}(b)+1]}^\# \subseteq (a, b), \text{ а}$$

$$\Delta_{a_1(b) \dots a_k(b)[a_{k+1}(b)+1]cs}^\# \cap C = \emptyset.$$

Тому множина  $C[\Delta^\#, \overline{cs}]$  є ніде не щільною за означенням.

Доведемо, що міра Лебега множини  $C[\Delta^\#, \overline{cs}]$  рівна нулю. Можливі випадки: 1)  $c = s$ ; 2)  $c \neq s$ .

Нехай  $\overline{\Delta}_{c_1 \dots c_m}^\# \equiv \Delta_{c_1 \dots c_m}^\# \cap C$ . Тоді у першому випадку

$$C = \left[ \bigcup_{i \neq c} \overline{\Delta}_i^\# \right] \cup \left[ \bigcup_{i \neq c} \overline{\Delta}_{ci}^\# \right].$$

У другому випадку

$$C = \left[ \bigcup_{i \neq c} \overline{\Delta}_i^\# \right] \cup \left[ \bigcup_{c \neq i \neq s} \overline{\Delta}_{ci}^\# \right] \cup \left[ \bigcup_{c \neq i \neq s} \overline{\Delta}_{cci}^\# \right] \cup \dots \cup$$

$$\cup \left[ \bigcup_{c \neq i \neq s} \underbrace{\overline{\Delta}_{c \dots c i}^\#}_k \right] \cup \dots \cup \Delta_{(c)}^\#.$$

Нехай  $F_0 = (0, 1]$ ,  $F_{2k}$  — об'єднання циліндрів рангу  $2k$ , які містять точки множини  $C[\Delta^\#, \overline{cs}]$ ,

$$\overline{F}_{2(k+1)} = F_{2k} \setminus F_{2(k+1)}. \quad (5)$$

Очевидно, що

$$F_{2k} \supseteq F_{2(k+1)} \supseteq C[\Delta^\#, \overline{cs}] \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

$$C[\Delta^\#, \overline{cs}] = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} F_{2k}.$$

За неперервністю міри Лебега зверху

$$\lambda(C[\Delta^\#, \overline{cs}]) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda(F_{2k}).$$

Тоді

$$\lambda(C[\Delta^\#, \overline{cs}]) =$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \left[ \frac{\lambda(F_{2k})}{\lambda(F_{2(k-1)})} \cdot \frac{\lambda(F_{2(k-1)})}{\lambda(F_{2(k-2)})} \cdot \dots \cdot \frac{\lambda(F_2)}{\lambda(F_0)} \right] =$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \prod_{m=1}^k \frac{\lambda(F_{2m})}{\lambda(F_{2(m-1)})} = \prod_{m=1}^{\infty} \frac{\lambda(F_{2m})}{\lambda(F_{2(m-1)})}. \quad (6)$$

З (5) маємо

$$\lambda(F_{2(k+1)}) = \lambda(F_{2k}) - \lambda(\overline{F}_{2(k+1)})$$

і

$$\frac{\lambda(F_{2(k+1)})}{\lambda(F_{2k})} = 1 - \frac{\lambda(\overline{F}_{2(k+1)})}{\lambda(F_{2k})}.$$

Підставивши в (6) отриманий вираз, одержимо

$$\lambda(C[\Delta^\#, \overline{cs}]) = \prod_{k=1}^{\infty} \left( 1 - \frac{\lambda(\overline{F}_{2(k+1)})}{\lambda(F_{2k})} \right).$$

Останній нескінченний добуток розбігається до нуля тоді і тільки тоді, коли

$$\sum_{k=1}^{\infty} \lambda(\overline{F}_{2(k+1)}) / \lambda(F_{2k}) = \infty. \quad (7)$$

Знайдемо оцінки останнього відношення.

Нехай  $\Delta_{c_1 \dots c_{2k}}^\#$  — циліндр з  $F_{2k}$ . Можливі випадки: 1)  $c_{2k} = c$ , 2)  $c_{2k} \neq c$ .

Якщо  $c_{2k} = c$ , то

$$\nabla_{c_1 \dots c_{2k}s}^\# \cap C[\Delta^\#, \overline{cs}] = \emptyset \quad \text{і}$$

$$\frac{|\Delta_{c_1 \dots c_{2k}s}^\#|}{|\Delta_{c_1 \dots c_{2k}}^\#|} = \frac{1}{2^s}.$$

Якщо  $c_{2k} \neq c$ , то

$$\nabla_{c_1 \dots c_{2k}cs}^\# \cap C[\Delta^\#, \overline{cs}] = \emptyset \quad \text{і}$$

$$\frac{|\Delta_{c_1 \dots c_{2k}cs}^\#|}{|\Delta_{c_1 \dots c_{2k}}^\#|} = \frac{1}{2^{c+s}}.$$

Тому, враховуючи це, маємо

$$0 < \frac{1}{2^{c+s}} \leq \frac{\lambda(\overline{F}_{2(k+1)})}{\lambda(F_{2k})} \leq \frac{1}{2^s} < 1.$$

Отже, ряд (7) розбігається, оскільки не виконується необхідна умова збіжності і тому  $\lambda(C[\Delta^\#, \overline{cs}]) = 0$ . Теорему 5 доведено.

**5. Деякі задачі ймовірнісної теорії чисел.** У традиційному розумінні ймовірнісна теорія чисел займається теоретико-числовими проблемами з використанням ймовірнісних засобів (моделей, прийомів та методів). Ймовірнісна теорія зображень дійсних чисел розв'язує ймовірнісні проблеми (задачі) з використанням різних систем зображення чисел. Її важливою складовою є вивчення розподілів ймовірностей на множинах дійсних чисел, визначених умовами



на їх зображення у тій чи іншій системі, зокрема випадкових величин, символи (цифри) зображення яких є випадковими величинами з наперед заданими розподілами.

Використаємо  $\Delta^\#$ -зображення чисел для моделювання і дослідження розподілів випадкових величин.

**Теорема 6.** *Якщо випадкова величина  $\tau = \Delta^\#_{\tau_1 \tau_2 \dots \tau_k \dots}$  має рівномірний на  $(0, 1]$  розподіл, то символи  $\tau_k$  її  $\Delta^\#$ -зображення є незалежними випадковими величинами, що мають однакові розподіли*

$$P\{\tau_k = i\} = \frac{1}{2^i}, \quad i = 1, 2, \dots \quad (8)$$

**Доведення.** Оскільки  $\tau$  має рівномірний розподіл на  $(0, 1]$ , то

1.  $P\{\tau = a\} = 0$  для довільного  $a \in (0, 1]$ ;
2.  $P\{\tau \in (a, b)\} = P\{\tau \in [a, b]\} = P([a, b]) = b - a$ , зокрема для довільного циліндра  $\Delta^\#_{c_1 \dots c_m}$ , враховуючи вираз його довжини, має місце рівність

$$P(\Delta^\#_{c_1 \dots c_m}) = |\Delta^\#_{c_1 \dots c_m}| = \frac{1}{2^{c_1 + \dots + c_m}} = \prod_{i=1}^m \frac{1}{2^{c_i}}.$$

Скористаємось методом математичної індукції, тобто доведемо, що для довільного  $k \in \mathbb{N}$  випадкова величина  $\tau_k$  не залежить від  $\tau_j$ , де  $j < k$  і мають місце рівності (8).

Враховуючи неперервність розподілу випадкової величини  $\tau$  та властивості циліндрів, маємо

$$P\{\tau_1 = i\} = P\{\tau \in \Delta^\#_i\} = P(\Delta^\#_i) = |\Delta^\#_i| = \frac{1}{2^i};$$

$$\begin{aligned} P\{\tau_1 = i, \tau_2 = j\} &= P\{\tau \in \Delta^\#_{ij}\} = \\ &= P(\Delta^\#_{ij}) = |\Delta^\#_{ij}| = \frac{1}{2^{i+j}} = |\Delta^\#_i| \cdot |\Delta^\#_j| = \\ &= P(\Delta^\#_i)P(\Delta^\#_j) = P\{\tau_1 = i\} \cdot P\{\tau_2 = j\} = \frac{1}{2^{i+j}}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{\tau_2 = i\} &= P\{\tau \in \bigcup_{j=1}^{\infty} \Delta^\#_{ji}\} = P(\bigcup_{j=1}^{\infty} \Delta^\#_{ji}) = \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} |\Delta^\#_{ji}| = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^{i+j}} = \frac{1}{2^i} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2^i}. \end{aligned}$$

Аналогічно,

$$\begin{aligned} P\{\tau_{k+1} = i\} &= P\{\tau \in \bigcup_{j_1=1}^{\infty} \dots \bigcup_{j_k=1}^{\infty} \Delta^\#_{j_1 \dots j_k i}\} = \\ &= \sum_{j_1=1}^{\infty} \dots \sum_{j_k=1}^{\infty} |\Delta^\#_{j_1 \dots j_k i}| = \\ &= \frac{1}{2^i} \sum_{j_1=1}^{\infty} \dots \sum_{j_k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{j_1 + j_2 + \dots + j_k}} = \frac{1}{2^i}. \end{aligned}$$

Оскільки остання ймовірність не залежить від  $k$ , а лише від  $i$ , то  $\tau_k$  є незалежними і однаково розподіленими. Теорему доведено.

**Теорема 7.** *Якщо символи  $\xi_k$   $\Delta^\#$ -зображення випадкової величини*

$$\xi = \Delta^\#_{\xi_1 \xi_2 \dots \xi_n \dots}$$

*є незалежними випадковими величинами, які набувають значень  $1, 2, \dots, i, \dots$  з ймовірностями  $p_{1k}, p_{2k}, \dots, p_{ik}, \dots$  відповідно ( $p_{1k} + \dots + p_{ik} + \dots = 1, k \in \mathbb{N}$ ), то розподіл  $\xi$  є або чисто дискретним, або чисто неперервним (неатомарним), причому чисто дискретним — тоді і тільки тоді, коли*

$$M = \prod_{k=1}^{\infty} \max_i \{p_{ik}\} > 0.$$

*Точковий спектр (множина атомів) дискретно розподіленої випадкової величини  $\xi$  складається з точки  $x_0$  такої, що*

$$p_{a_j(x_0)j} = \max_i \{p_{ik}\},$$

*і всіх точок  $x$ , які мають властивість  $p_{a_j(x)j} > 0$  для будь-якого  $j \in \mathbb{N}$  і існує таке  $t \in \mathbb{N}$ , що  $a_j(x) = a_j(x_0)$  при  $j \geq t$ .*

**Доведення.** Зауважимо, що випадкова величина  $\xi$  не набуває значень з множини точок, які мають скінченні  $\Delta^\#$ -зображення. Тому у подальших міркуваннях ми нехтуємо точками цієї множини. А решта точок  $(0; 1]$  мають єдине  $\Delta^\#$ -зображення.

З незалежності  $\xi_k$  і єдиності  $\Delta^\#$ -зображення випливає, що

$$P\{\xi = \Delta_{c_1 c_2 \dots c_m \dots}^\# \} = \prod_{k=1}^{\infty} p_{c_k k},$$

тобто  $P\{\xi = x\} = \prod_{j=1}^{\infty} p_{a_j(x)j}.$

Спочатку доведемо *необхідність*: якщо  $M > 0$ , то розподіл  $\xi$  є чисто дискретним. Оскільки  $P\{\xi = x_0\} = M$ , то  $P\{\xi = x_0\} > 0$ .

Якщо  $p_{a_k(x')k} > 0$  для будь-якого  $k \in N$  і  $\Delta^\#$ -зображення точки  $x'$  відрізняється від зображення точки  $x_0$  не більше, ніж першими  $(m-1)$   $\Delta^\#$ -символами, то

$$\begin{aligned} P\{\xi = x'\} &= \prod_{k=1}^{m-1} p_{a_k(x')k} \cdot \prod_{k=m}^{\infty} p_{a_k(x_0)k} = \\ &= \prod_{k=1}^{m-1} p_{a_k(x')k} \cdot \frac{M}{\prod_{k=1}^{m-1} p_{a_k(x_0)k}}. \end{aligned}$$

Нехай  $A_m$  — множина всіх точок  $x'$ ,  $\Delta^\#$ -символи яких співпадають з  $\Delta^\#$ -символами точки  $x_0$ , починаючи з  $m$ . Тоді послідовність множин  $A_m$  має властивості:

1.  $\{x_0\} = A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_m \subset A_{m+1} \subset \dots$ ;
2.  $P\{\xi \in A_m\} =$

$$\begin{aligned} &= \sum_{a_1 \in N} \dots \sum_{a_{m-1} \in N} \left( \prod_{k=1}^{m-1} p_{a_k(x')k} \cdot \frac{M}{\prod_{k=1}^{m-1} p_{a_k(x_0)k}} \right) = \\ &= \frac{M}{\prod_{k=1}^{m-1} p_{a_k(x_0)k}} \rightarrow 1, \text{ коли } m \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Отже, зліченна множина

$$A = \lim_{m \rightarrow \infty} A_m = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$$

є носієм розподілу випадкової величини  $\xi$ , тобто розподіл є дискретним.

*Достатність.* Якщо  $\xi$  має дискретний розподіл, то існує  $x'$  таке, що

$$\begin{aligned} 0 < P\{\xi = x'\} &= \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} p_{a_k(x')k} \leq \prod_{k=1}^{\infty} \max_i \{p_{ik}\} = M, \end{aligned}$$

тобто  $M > 0$ . Теорему 7 доведено.

1. *Працьовитий М. В., Ісаєва Т. М.* Кодування дійсних чисел з нескінченим алфавітом і основою 2 // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. — 2013. — № 15. — С. 6-23.

2. *Minkowski H.* Gesammeine Abhandlungen. — Berlin, 1911. — Vol. 2. — P. 50-51.

3. *Paradis J., Viader P., Bibiloni L.* The derivative of Minkowski's  $?(x)$  function // J. Math. Anal. Appl. — 2001. — Vol. 253. — P. 107-125.

4. *Alkauskas G.* Semi-regular continued fractions and an exact formula for the moments of the Minkowski question mark function // Ramanujan J. — 2011. — Vol. 25, no. 3. — P. 359-367.

5. *Dushistova A. A., Kan I. D., Moshchevitin N. G.* Differentiability of the Minkowski Question mark function // J. Math. Anal. Appl. — 2013. — Vol. 401, no. 2. — P. 774-794.

6. *Працьовитий М. В., Калашніков А. В., Безбородов В. К.* Про один клас сингулярних функцій, що містить класичну функцію Мінковського // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. — 2010. — № 11. — С. 207-213.

7. *Калашніков А. В., Працьовитий М. В.* Сингулярність функцій однопараметричного класу, який містить функцію Мінковського // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. — 2011. — № 12. — С. 59-65.

8. *Працьовитий М. В.* Геометрія дійсних чисел у їх кодуваннях засобами нескінченного алфавіту як основа топологічних, метричних, фрактальних і ймовірнісних теорій // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. — 2013. — № 14. — С. 189-216.

9. *Працьовитий М. В.* Фрактальний підхід у дослідженнях сингулярних розподілів. — Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 1998. — 296 с.

10. *Биллингслей П.* Эргодическая теория и информация. — М.: Мир, 1969. — 238 с.

11. *Барановський О. М., Працьовитий М. В., Торбін Г. М.* Ряди Остроградського-Серпінського-Пірса та їхні застосування. — Київ: Наукова думка, 2013. — 268 с.

12. *Працьовитий М. В., Задніпряний М. В.* Геометрія і основи метричної теорії зображення дійсних чисел рядами Сільвестера // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. — 2011. — № 12. — С. 65-73.