

©2014 р. М. В. Працьовитий, І. О. Савченко

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

## МНОЖИНА НЕПОВНИХ СУМ ЧИСЛОВОГО РЯДУ З ОДНІЄЮ НЕЛІНІЙНОЮ ВЛАСТИВІСТЮ ОДНОРІДНОСТІ

Досліджено тополого-метричні та фрактальні властивості множини  $E$  неповних сум збіжного знакододатного ряду  $a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1} + \dots = a_1 + a_2 + \dots + a_n + r_n$ , для якого виконується умова однорідності (по  $n$ )  $r_n = a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+1}$ ,  $\forall n \geq k$ , де  $2 \leq k$  – фіксоване натуральне число. Доведено, що арифметична сума  $E \underbrace{\oplus \dots \oplus}_s E$  скінченної кількості множин

$E$  неповних сум є аномальною фрактальною множиною.

The article is devoted to the investigation of metric, topological and fractal properties of the set of subsums of a numerical series  $a_1 + a_2 + \dots + a_n + a_{n+1} + \dots = a_1 + a_2 + \dots + a_n + r_n$ , which satisfy the following condition of homogeneity:  $r_n = a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+1}$ ,  $n \geq k$ , where  $k$  is a fixed integer number,  $k \geq 2$ . It is proved that the arithmetic sum  $E \underbrace{\oplus \dots \oplus}_s E$  of an arbitrary number of the sets  $E$  of subsums is an anomalously fractal.

**1. Вступ.** Розглядається збіжний знакододатний ряд

$$r_0 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + r_n. \quad (1)$$

Нехай  $M$  – підмножина  $\mathbb{N}$  натуральних чисел, вираз  $\sum_{n \in M \subseteq \mathbb{N}} a_n$  називається *підрядом ряду* (1), а його сума  $x = x(M)$  – *неповною сумою* (*підсумою*) ряду (1). Очевидно, що

$$x(M) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \varepsilon_n, \text{ де } \varepsilon_n = \begin{cases} 1, & \text{якщо } n \in M; \\ 0, & \text{якщо } n \notin M. \end{cases}$$

Множину всіх неповних сум ряду (1) позначатимемо через  $E\{a_n\}$ , тобто

$$E\{a_n\} \equiv \left\{ x : x = \sum_{n \in M} a_n, M \in 2^{\mathbb{N}} \right\}.$$

Усі частинні суми  $S_n = \sum_{i=1}^n a_i$  і залишки  $r_n$  даного ряду є його неповними сумами. Очевидно, що  $E\{a_n\} \subseteq [0, r_0]$ .

Тополого-метричні властивості множин неповних сум рядів суттєво залежать від їх швидкості збіжності. Наступні три факти про множину  $E\{a_n\}$  неповних сум ряду

(1), у якого  $a_n \geq a_{n+1}$  для всіх  $n$ , встановили С.Какея [4] в 1914 році (і незалежно Г.Горнич [3] в 1941):

- 1)  $E\{a_n\}$  є досконалою множиною.
- 2)  $E\{a_n\}$  є скінченим об'єднанням відрізків тоді й лише тоді, коли  $a_n \leq r_n$  для достатньо великих  $n$ . ( $E\{a_n\}$  – відрізок тоді й лише тоді, коли  $a_n \leq r_n$  для всіх  $n$ .)
- 3) Якщо  $a_n > r_n$  для достатньо великих  $n$ , то  $E\{a_n\}$  є гомеоморфною класичній множині Кантора.

У тій же роботі [4] С.Какея висунув припущення, що при виконанні умови  $a_n > r_n$  для нескінченної кількості  $n$ , множина  $E\{a_n\}$  буде ніде не щільною (а, отже, гомеоморфною множині Кантора). Перший контрприклад навели в 1980 р. (без доведення) А.Д. Вайнштейн і Б.З. Шапіро [7]. Незалежно, Ференс [1] навів в 1984 р. інший приклад (з доведенням). Простіший приклад представили Дж. Гутрі і Дж. Ньюман [2]:

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} + \frac{3}{4^2} + \frac{2}{4^2} + \frac{3}{4^3} + \frac{2}{4^3} + \dots \quad (2)$$

Для цього ряду, як і у прикладах із вище наведених робіт, нерівності  $a_n > r_n$  і  $a_n \leq r_n$  виконуються нескінченною кількістю разів. Множина неповних сум ряду (2) містить відрізок  $[\frac{3}{4}, 1]$ , але не є скінченим об'

єднанням відрізків. В цій же роботі [2], автори сформулювали теорему, остаточно доведену в [5]:

**Теорема 1.** *Множина  $E\{a_n\}$  неповних сум збіжного знакододатного ряду (1) є однією з наступних:*

- 1) скінченним об'єднанням відрізків;
- 2) гомеоморфною множині Кантора;
- 3) гомеоморфною множині  $T$  неповних сум ряду (2).

Найбільш загадковим є випадок, коли нерівності  $a_n \leq r_n$  і  $a_n > r_n$  виконуються для нескінченної кількості  $n$ . У такому разі множина неповних сум ряду може бути як ніде не щільною, так і може містити цілі відрізки. Про це свідчать приклади ряду (2) і ряду

$$\frac{5}{4} + \frac{3}{4} + \frac{5}{4^2} + \frac{3}{4^2} + \frac{4}{4^3} + \frac{3}{4^3} + \dots . \quad (3)$$

Множина неповних сум ряду (3) є ніде не щільною нуль-множиною Лебега, розмірність Гаусдорфа-Безиковича якої дорівнює

$$\log_4(2 + \sqrt{2}) \approx 0,8858.$$

(результат, встановлений авторами).

На сьогодні авторам невідомі необхідні і достатні умови нуль-мірності (у розумінні міри Лебега), а також ніде не щільності множини неповних сум ряду (1). Менш дослідженими є фрактальні властивості множини  $E\{a_n\}$ , хоча для деяких класів рядів це успішно зроблено в [6], [8]-[14]. Задача обчислення міри Лебега та розмірності Гаусдорфа-Безиковича множини неповних сум ряду в загальній постановці поки що не піддається розв'язанню, тому дослідники її розв'язують для певних класів.

У даній роботі ми цікавимось топологометричними та фрактальними властивостями множини неповних сум ряду (1), який володіє властивістю однорідності

$$r_n = a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+1}, \quad \forall n \geq k, \quad (4)$$

де  $k$  – фіксоване натуральне число,  $k \geq 2$ . Його множину неповних сум позначатимемо через  $E$ .

**2. Аналіз умови однорідності.** Будемо казати, що ряд (1) володіє властивістю однорідності (по  $n$ ), якщо існує ціле

невід'ємне число  $g$  і функція  $f$  такі, що  $r_n \vee f(a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-g+1})$  для всіх натуральних  $n \geq g$ , де символ  $\vee$  означає один із знаків:  $\gg$ ,  $\ll$ ,  $\leq$ ,  $\geq$ ,  $=$ .

**Лема 1.** Якщо  $a_1, a_2, \dots, a_k$  – додатні дійсні числа, то  $k$ -параметрична послідовність

$$a_{n+k} = \frac{a_{n+k-1} a_{n+k-2} \dots a_n}{1 + a_{n+k-1} \dots a_{n+1}}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5)$$

є нескінченно малою, а відповідний їй ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  – збіжним.

**Доведення.** З рівності (5) маємо

$$q_n \equiv \frac{a_{n+k}}{a_n} = \frac{a_{n+k-1} a_{n+k-2} \dots a_{n+1}}{1 + a_{n+k-1} \dots a_{n+1}} < 1.$$

Тому послідовності  $(a_{kn-p})_{n=1}^{\infty}$ , де  $p \in \{0, 1, \dots, k-1\}$ , є спадними. Більше того, оскільки  $a_n > a_{n+k}$  для всіх  $n \in \mathbb{N}$ , то

$$\begin{aligned} & \frac{a_{n+k-1} \dots a_{n+1}}{1 + a_{n+k-1} \dots a_{n+1}} - \frac{a_{n+2k-1} \dots a_{n+k+1}}{1 + a_{n+2k-1} \dots a_{n+k+1}} = \\ & = \frac{a_{n+k-1} \dots a_{n+1} - a_{n+2k-1} \dots a_{n+k-1}}{(1 + a_{n+k-1} \dots a_{n+1})(1 + a_{n+2k-1} \dots a_{n+k+1})} = \\ & = q_n - q_{n+k} > 0, \end{aligned}$$

тобто, спадними є і послідовності  $(q_{kn-p})_{n=1}^{\infty}$ . Тоді

$$a_{k(n+1)-p} = a_{k-p} \prod_{i=1}^n q_{ki-p}.$$

І тому

$$a_{kn-p} \leq a_{k-p} q_{k-p}^{n-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Отже, послідовності  $(a_{kn-p})_{n=1}^{\infty}$  є нескінченно малими і такою є вся послідовність  $(a_n)$ . Таким чином, необхідна умова збіжності ряду виконується. Оскільки

$$\begin{aligned} & \sum_{n=1}^{\infty} a_{kn-p} \leq a_{k-p} \sum_{n=1}^{\infty} q_{k-p}^{n-1} = \\ & = \frac{a_{k-p}(1 + a_{k-p+1} a_{k-p+2} \dots a_{2k-p-1})}{a_{k-p+1} a_{k-p+2} \dots a_{2k-p-1}}, \end{aligned}$$

то даний ряд збігається.

**Теорема 1.** Для того, щоб ряд (1) задовільняв умову однорідності (4), необхідно і достатньо, щоб для його членів виконувалась рівність (5).

**Доведення.** *Необхідність.* Якщо ряд збіжний і задовільняє умову однорідності (4), то для всіх  $n \in \mathbb{N}$  має місце система

$$\begin{cases} a_{n+k-1} \dots a_n = r_{n+k-1} = a_{n+k} + a_{n+k+1} + \dots, \\ a_{n+k} \dots a_{n+1} = r_{n+k} = a_{n+k+1} + a_{n+k+2} + \dots. \end{cases}$$

Віднявши від першої рівності другу, отримаємо:

$$a_{n+k-1} \dots a_n - a_{n+k} \dots a_{n+1} = a_{n+k}, \quad (6)$$

звідки і випливає рівність (5).

*Достатність.* Покажемо тепер, що з умови (5) випливає умова (4). Оскільки даний ряд збіжний (див. лему 1), то з рівності (5) маємо рівність (6). Врахувавши, що  $a_{n+k} = r_{n+k-1} - r_{n+k}$ , отримаємо

$$r_{n+k-1} - r_{n+k} = a_{n+k-1} \dots a_n - a_{n+k} \dots a_{n+1},$$

що рівносильно

$$r_{n+k-1} - a_{n+k-1} a_{n+k-2} \dots a_n =$$

$$r_{n+k} - a_{n+k} \dots a_{n+1}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

звідки

$$r_{n+k-1} - a_{n+k-1} \dots a_{n+1} =$$

$$r_{n+k-1+l} - a_{n+k-1+l} a_{n+k-1+l} = const$$

для всіх натуральних  $n$  і  $l$ . Оскільки

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (r_{n+k-1} - a_{n+k-1} a_{n+k-2} \dots a_n) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} r_{n+k-1} - \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+k-1} a_{n+k-2} \dots a_n = 0,$$

то

$$r_n - a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+1} = 0$$

або

$$r_n = a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+1}, \quad \forall n \geq k.$$

Достатність і вся теорема доведені.

**Лема 2.** *Ряд (1), що задовільняє умову однорідності (4), має суму*

$$r_0 = a_1 + a_2 + \dots + a_k + a_1 a_2 \dots a_k. \quad (7)$$

**Доведення.** З рівності (4) маємо рівність

$$a_1 a_2 \dots a_k = a_{k+1} + a_{k+2} + a_{k+3} + \dots.$$

Додавши до обох її частин  $a_1 + a_2 + \dots + a_k$ , отримаємо (7).

**Лема 3.** *Для членів ряду (1), що задовільняє умову однорідності (4), мають місце рівності*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0, \quad (8)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{q^n} = 0, \quad (9)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n n! = 0, \quad (10)$$

де  $q$  – довільне дійсне число з  $(0, 1)$ .

**Доведення.** Врахувавши збіжність даного ряду та рівність (4), маємо

$$\begin{aligned} a_{n-k+1} &= \frac{r_n}{a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+2}} = \\ &= \frac{a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots}{a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+2}} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{a_{n+m}}{a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+2}}. \end{aligned}$$

Останній ряд збігається при кожному  $n \in \mathbb{N}$ , а його сума разом з  $a_{n-k+1}$  прямує до нуля при  $n \rightarrow \infty$ , тобто

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n-k+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+2}} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{a_{n+2}}{a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+2}} + \dots + \frac{a_{n+m}}{a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+2}} + \dots \right) = 0, \end{aligned}$$

тому і

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+m}}{a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+2}} = 0, \quad m = 1, 2, 3, \dots,$$

таким чином, рівність (8) доведено.

Оскільки справедлива рівність (8), то існують  $n_0 \in \mathbb{N}$  та  $\varepsilon > 0$  такі, що для всіх  $n > n_0$  виконується нерівність  $\frac{a_{n+1}}{a_n} < \varepsilon$  або  $a_{n+1} < \varepsilon a_n$ . Нехай  $a_{m+s} < 1$  для всіх  $s = 0, 1, 2, \dots$ . Маємо нерівності

$$a_{m+s} < \varepsilon a_{m+s-1} < \varepsilon^2 a_{m+s-2} < \dots < \varepsilon^s a_m < \varepsilon^s.$$

Отже,  $a_{m+s} < \varepsilon^s$  або  $a_n < \varepsilon^{n-m} = \frac{1}{\varepsilon^m} \varepsilon^n = c \varepsilon^n$ , де  $s = n - m$ ,  $c = const$ . Взявши  $\varepsilon < q$ , отримаємо рівність (9).

Доведення рівності (10) проведемо для випадку, коли в рівності (4)  $k = 2$ . З рівності (8) випливає існування такого номеру  $m$ ,

що для всіх  $n \geq m$  має місце  $a_{n+1} < a_n < 1$ .  
Оцінимо члени ряду:

$$\begin{aligned} a_{m+2} &= \frac{a_{m+1}a_m}{1+a_{m+1}} < a_ma_{m+1} < a_m^2, \\ a_{m+3} &= \frac{a_{m+2}a_{m+1}}{1+a_{m+2}} < a_{m+2}a_{m+1} < a_m^3, \\ a_{m+4} &= \frac{a_{m+3}a_{m+2}}{1+a_{m+3}} < a_{m+3}a_{m+2} < a_m^3a_m^2 = a_m^5, \\ a_{m+5} &= \frac{a_{m+4}a_{m+3}}{1+a_{m+4}} < a_{m+4}a_{m+3} < a_m^8, \dots . \end{aligned}$$

Нескладно побачити, що показники степенів  $u_{j+1}$  членів  $a_m^{u_{j+1}}$ , якими обмежені члени  $a_{m+j}$ , утворюють класичну послідовність Фібоначчі із загальним членом

$$\begin{aligned} u_j &= \frac{1}{\sqrt{5}} (\varphi^j - \psi^j) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left( 1 - \left( \frac{\psi}{\varphi} \right)^j \right) \cdot \varphi^j \rightarrow \frac{1}{\sqrt{5}} \varphi^j \quad (j \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

де  $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ,  $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ .

Отже, маємо

$$a_n = a_{m+j} < a_n^{\varphi^{n-m+1}} = p^{\varphi^n},$$

де  $p = a_m^{\varphi^{1-m}}$  — деяке число з  $(0, 1)$ .

Для доведення рівності (10) достатньо показати, що  $\lim_{n \rightarrow \infty} (p^{\varphi^n} \cdot n!) = 0$ . А це випливає з того, що  $n! < n^n$  при кожному  $n > 2$  і того, що  $\lim_{n \rightarrow \infty} (p^{\varphi^n} \cdot n^n) = 0$  (більше того, ряд з членом  $b_n = p^{\varphi^n} \cdot n^n$  є збіжним).

Для доведення твердження у загальному випадку ( $k > 2$  в рівності (4)) можна піти тим самим шляхом. Для членів  $a_n$  даного ряду з деякого номеру  $m$  виконується нерівність  $a_n < a_m^{v_j}$ , де  $j = n - m$ ,  $(v_j)_{j=1}^\infty$  — рекурентна послідовність, кожний член якої дорівнює сумі  $k$  попередніх, тобто  $v_j = v_{j-1} + v_{j-2} + \dots + v_{j-k}$  для всіх  $j \leq k$ . Для членів такої послідовності має місце асимптотична формула виду

$$v_j \sim c \cdot \theta^n,$$

де  $c, \varphi$  — сталі,  $c > 0$ ,  $\theta > \varphi$ .

**Наслідок 1.** Для довільного  $q \in (0, 1)$  існує номер  $n_0$  такий, що для всіх  $n > n_0$  виконується нерівність  $a_n < q^n$ .

**3. Властивості множини  $E$ .** При вивчені властивостей множини  $E\{a_n\}$  неповних сум ряду (1) корисними є поняття циліндра та циліндричного відрізка.

**Означення 1.** Нехай  $(c_1, c_2, \dots, c_m)$  — фіксований впорядкований набір нулів та одиниць. Циліндром рангу  $m$  з основою  $c_1c_2\dots c_m$  ( $c_i \in \{0, 1\}$ ) називається множина  $\Delta'_{c_1\dots c_m}$ , яка містить всі неповні суми ряду (1) виду

$$\sum_{n=1}^m c_n a_n + \sum_{n=m+1}^{\infty} \varepsilon_n a_n, \text{ де } \varepsilon_n \in \{0, 1\}.$$

Циліндричним відрізком рангу  $m$  з основою  $c_1c_2\dots c_m$  називається відрізок

$$\begin{aligned} \Delta_{c_1\dots c_m} &= [\inf \Delta'_{c_1\dots c_m}, \sup \Delta'_{c_1\dots c_m}] = \\ &= \left[ \sum_{n=1}^m c_n a_n, r_m + \sum_{n=1}^m c_n a_n \right]. \end{aligned}$$

З означень випливають наступні властивості циліндричних множин.

$$\begin{aligned} 1) \quad \Delta'_{c_1\dots c_m} &\subset \Delta_{c_1\dots c_m}, \inf \Delta_{c_1\dots c_m} = \\ &= \inf \Delta'_{c_1\dots c_m}, \sup \Delta_{c_1\dots c_m} = \sup \Delta'_{c_1\dots c_m}. \end{aligned}$$

$$2) \quad \Delta'_{c_1\dots c_m} = \Delta'_{c_1\dots c_m 0} \cup \Delta'_{c_1\dots c_m 1}.$$

3) Діаметр циліндра не залежить від його основи, а лише від рангу:

$$d(\Delta'_{c_1\dots c_m}) = |\Delta_{c_1\dots c_m}| = r_m \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty).$$

4) Для довільної послідовності  $(c_m)$  нулів та одиниць має місце

$$\begin{aligned} \bigcap_{m=1}^{\infty} \Delta_{c_1\dots c_m} &= \bigcap_{m=1}^{\infty} \Delta'_{c_1\dots c_m} \equiv \Delta_{c_1\dots c_m\dots} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n a_n = x \in E\{a_n\} \subseteq [0, r_0]. \end{aligned}$$

5) Для кожного натурального  $m$  має місце включення

$$E\{a_n\} \subset G_{m+1} \subset G_m, \text{ де } G_m = \bigcup_{(c_1\dots c_m)} \Delta_{c_1\dots c_m}.$$

$$6) \quad E\{a_n\} = \lim_{m \rightarrow \infty} G_m = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{(c_1\dots c_m)} \Delta_{c_1\dots c_m}.$$

Нагадаємо означення  $\alpha$ -*міри Гаусдорфа* і *розмірності Гаусдорфа-Безиковича* множини  $F \subset \mathbb{R}^1$ , які більш тонко характеризують «*масивність*» множин у випадку їх нульмірності (у розумінні міри Лебега).

**Означення 2.** Нехай  $0 < \alpha$  — фіксоване дійсне число,  $\alpha$ -*мірною мірою* ( $\alpha$ -*мірою*) *Гаусдорфа* множини  $F$  називається значення функції множини, визначені рівністю

$$\mathcal{H}^\alpha(F) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} m_\varepsilon^\alpha(F) = \sup_{\varepsilon > 0} m_\varepsilon^\alpha(F), \text{ де}$$

$$m_\varepsilon^\alpha(F) = \inf_{|F_j| \leq \varepsilon} \left\{ \sum_j |F_j|^\alpha \right\}$$

і точна нижня грань визначається за всеможливими не більш ніж зчисленними покриттями множини  $F$  відрізками  $F_i$ , діаметри  $|F_i|$  яких не перевищують  $\varepsilon$ .

Невід'ємне число

$$\begin{aligned} \alpha_0(F) &= \sup \{ \alpha : \mathcal{H}^\alpha(F) = +\infty \} = \\ &= \inf \{ \alpha : \mathcal{H}^\alpha(F) = 0 \} \end{aligned}$$

називається *розмірністю Гаусдорфа-Безиковича* множини  $F$ .

Розмірність Гаусдорфа-Безиковича має *властивості*:

- 1) Якщо  $F_1 \subset F_2$ , то  $\alpha_0(F_1) \leq \alpha_0(F_2)$ ;
- 2)  $\alpha_0 \left( \bigcup_i F_i \right) = \sup_i \alpha_0(F_i)$ .

**Теорема 2.** *Множина  $E$  неповних сум ряду (1), що задоволяє умову однорідності (4), є ніде не щільною множиною нульової міри Лебега і нульової розмірності Гаусдорфа-Безиковича.*

**Доведення.** Розглянемо рівність (4). Оскільки  $a_n \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), то існує номер  $n_0 \in \mathbb{N}$  такий, що для всіх  $n > n_0$  виконується нерівність:

$$a_{n-1} < 1, a_{n-2} < 1, \dots, a_{n-k} < 1,$$

а разом з ними і нерівності

$$a_{n-1}a_{n-2}\dots a_{n-k} < 1 \text{ та } a_n > r_n.$$

Тому, згідно [4], множина  $E$  — ніде не щільна.

Згідно властивостей 3 і 5 циліндричних множин, множина  $E$  належить об'єднанню

$2^n$  циліндричних відрізків рангу  $n$  діаметра  $r_n$ . Тому, враховуючи властивість 6, її міра Лебега

$$\lambda(E) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n a_n a_{n-1} \dots a_{n-k}.$$

За наслідком 1

$$\begin{aligned} \lambda(E) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n q^n q^{n-1} \dots q^{n-k+1} = \\ &= q^{-\frac{k(k-1)}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} (2q^k)^n = 0, \end{aligned}$$

де  $q$  — достатньо мале число, для якого  $2q^k < 1$ , отже,  $\lambda(E) = 0$ .

Для знаходження розмірності Гаусдорфа-Безиковича множини  $E$  розглянемо її  $\varepsilon$ -покриття циліндричними відрізками рангу  $n$ , де  $\varepsilon = |\Delta_{c_1 \dots c_n}| = r_n$ . Тоді

$$\begin{aligned} m_\varepsilon^\alpha(E) &\leq 2^n (r_n)^\alpha = 2^n (a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+1})^\alpha < \\ &< 2^n (q^n q^{n-1} \dots q^{n-k+1})^\alpha = q^{-\frac{\alpha k(k-1)}{2}} (2q^{k\alpha})^n. \end{aligned}$$

Оскільки  $q$  є числом як завгодно малим, то  $2q^{k\alpha} < 1$  і  $q^{-\frac{\alpha k(k-1)}{2}} (2q^{k\alpha})^n \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ), тому

$$\mathcal{H}^\alpha(E) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} m_\varepsilon^\alpha(E) = 0$$

для довільного  $\alpha > 0$ . Отже,  $\alpha_0(E) = 0$ .

Теорему доведено.

Континуальні множини, які мають нульову розмірність Гаусдорфа-Безиковича називають *аномально фрактальними*.

**4. Арифметині (векторні) суми множин  $E$  неповних сум.**

**Означення 3.** *Арифметичною (векторною) сумою* множин  $A$  і  $B$  називається множина

$$C = A \oplus B = \{x : x = a + b, a \in A, b \in B\}.$$

Добре відомим є той факт, що арифметична сума двох класичних множин Кантора  $C$  є відрізком  $[0, 2]$ , тобто  $C \oplus C = [0, 2]$ .

З'ясуємо, якою множиною буде арифметична сума двох та довільної скіченної кількості множин  $E$  неповних сум ряду (1), який володіє властивістю однорідності (4).

Нехай  $(E^{(j)})_{j=1}^s$  — послідовність, яка складається з  $s \geq 2$  одинакових множин  $E$ , тобто

$$(E, E, \dots, E) \equiv (E^{(j)})_{j=1}^s.$$

Розглянемо арифметичну суму:

$$E_s = \bigoplus_{j=1}^s E^{(j)}.$$

**Лема 4.** *Множина  $E_s$  має вигляд*

$$E_s = \left\{ x : x = \sum_{n=1}^{\infty} \eta_n a_n, \eta_n \in \{0, 1, \dots, s\} \right\}.$$

**Доведення.** Множина  $E^{(j)}$  містить всі суми виду

$$\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n^{(j)} a_n,$$

де  $\varepsilon_n^{(j)} \in \{0, 1\}$ , а множина  $E_s$  містить всі суми виду

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^s \varepsilon_n^{(j)} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \eta_n a_n,$$

де  $\eta_n = \sum_{j=1}^s \varepsilon_n^{(j)} \in \{0, 1, \dots, s\} \equiv A_s$ .

Для множини  $E_s$  циліндром рангу  $n$  з основою  $d_1 d_2 \dots d_n$  називатимемо множину  $\Delta'_{d_1 d_2 \dots d_m}$ , яка містить всі суми виду

$$\sum_{i=1}^m d_i a_i + \sum_{i=m+1}^{\infty} \xi_i a_i, \text{ де } \xi_i \in A_s$$

і  $(d_1 d_2 \dots d_m)$  – фіксований впорядкований набір чисел з множини  $A_s$ .

Циліндричним відрізком рангу  $n$  з основою  $d_1, d_2, \dots, d_n$  назовемо відрізок

$$\begin{aligned} \Delta_{d_1 d_2 \dots d_m} &= [\inf \Delta'_{d_1 d_2 \dots d_m}, \sup \Delta'_{d_1 d_2 \dots d_m}] = \\ &= \left[ \sum_{n=1}^m d_n a_n, sr_m + \sum_{n=1}^m d_n a_n \right]. \end{aligned}$$

Легко бачити, що

$$\Delta'_{d_1 d_2 \dots d_m} = \Delta'_{d_1 d_2 \dots d_m 0} \cup \dots \cup \Delta'_{d_1 d_2 \dots d_m s}. \quad (11)$$

Справедливими також є включення

$$E_s \subset U_{m+1} \subset U_m \quad (\forall m \in \mathbb{N})$$

і рівність

$$E_s = \lim_{m \rightarrow \infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} U_m, \quad (12)$$

де  $U_m = \bigcup_{(d_1 \dots d_m)} \Delta_{d_1 \dots d_m}$ .

**Теорема 3.** *Множина  $E_s$  є аномальною фрактальною множиною.*

**Доведення.** Згідно рівностей (11) та (12), множина  $E_s$  належить об'єднанню  $(s+1)^n$  ізометричних циліндричних відрізків рангу  $n$  діаметра  $sr_n$  і її міра Лебега

$$\begin{aligned} \lambda(E_s) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (s(s+1)^n r_n) = \\ &= s \lim_{n \rightarrow \infty} ((s+1)^n a_n a_{n-1} \dots a_{n-k+1}). \end{aligned}$$

За наслідком 1

$$\begin{aligned} \lambda(E_s) &\leq s \lim_{n \rightarrow \infty} (s+1)^n q^n q^{n-1} \dots q^{n-k+1} = \\ &= sq^{-\frac{k(k-1)}{2}} \lim_{n \rightarrow \infty} ((s+1)q^k)^n = 0, \end{aligned}$$

оскільки  $(s+1)q^k < 1$ ,  $q$  – достатньо мале. Отже,  $\lambda(E_s) = 0$ .

Зрозуміло, що континуальна множина  $E_s$  нульової міри Лебега є ніде не щільною.

Для знаходження розмірності Гаусдорфа-Безиковича множини  $E_s$  розглянемо її  $\varepsilon$ -покриття циліндричними відрізками рангу  $n$ , де  $\varepsilon = sr_n \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow \infty$ . Для довільного  $\alpha > 0$  і довільного  $n$  маємо

$$\begin{aligned} m_{\varepsilon}^{\alpha}(E_s) &= (s+1)^n (sa_n a_{n-1} \dots a_{n-k+1})^{\alpha} \leq \\ &\leq (s+1)^n (sq^n \dots q^{n-k+1})^{\alpha} = \\ &= \left( sq^{\frac{k(1-k)}{2}} \right)^{\alpha} \cdot ((s+1)q^k)^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Отже,

$$\mathcal{H}^{\alpha}(E_s) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} m_{\varepsilon}^{\alpha}(E_s) = 0$$

для довільного  $\alpha > 0$ . Тому  $\alpha_0(E_s) = 0$  і аномальну фрактальність множини  $E_s$  дово- ведено.

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ferens C. On the range of purely atomic probability measures // Studia Math. – 1984. – 77. – C. 261-263.

2. Guthrie J.A., Nyman J.E. The topological structure of the set of subsums of an infinite series // Studia Math. – 1988. – 55, №2. – C. 323-327.

3. Hornich H. Über beliebige Teilsummen absolut konvergenter Reihen // Monatsh. Math. Phys. – 1941. – 49. – C. 316-320.

- 
4. *Kakeya S.* On the partial sums of an infinite series // *Tôhoku Sci. Rep.* – 1915. – **3**, №4. – C. 159-164.
5. *Nymann J.E., Sáenz R.A.* On the paper of Guthrie and Nymann on subsums of infinite series // *Colloq. Math.* – 2000. – **83**. – C. 1-4.
6. *Pratsiovytyi M.V., Feshchenko O.Y.* Topological, metric and fractal properties of probability distributions on the set of incomplete sums of positive series // *Theory of Stochastic Processes.* – 2007. – **13(29)**, №1-2. – C. 205-224.
7. *Weinstein A.D., Shapiro B.E.* On the structure of a set of  $\bar{\alpha}$ -representable numbers // *Izv. Vysš. Učebn. Zaved. Matematika.* – 1980. – **24**. – C. 8-11.
8. *Барановський О.М., Працьовитий М.В., Торбін Г.М.* Ряди Остроградського–Серпінського–Пірса та їх застосування. – К.: Наукова Думка, 2013. – 288 с.
9. *Гончаренко Я.В., Працьовитий М.В., Торбін Г.М.* Топологометричні і фрактальні властивості множини неповних сум знакододатного ряду та розподілів на ній // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – 2005. – №6. – С. 210-224.
10. *Гончаренко Я.В., Працьовитий М.В., Торбін Г.М.* Фрактальні властивості деяких згорток Бернуллі // Теор. ймовірност. матем. статист. – 2008. – **79**. – С. 34-49.
11. *Корсунь Н.О., Працьовитий М.В.* Про множину неповних сум знакододатних рядів з однією умовою однорідності та узагальнення двійкового зображення чисел // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 1. Фізико-математичні науки. – 2009. – №10. – С. 28-39.
12. *Працьовитий М.В.* Фрактальний підхід у дослідженнях сингулярних розподілів / М.В. Працьовитий. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 296 с.
13. *Працьовитий М.В., Торбін Г.М.* Один клас випадкових величин типу Джессена-Вінтнера // Доп. НАН України. – 1998. – №4. – С. 48-54.
14. *Турбін А.Ф., Працевитий Н.В.* Фрактальные множества, функции, распределения. – К.: Наукова Думка, 1992. – 208 с.