

до відростання нових нігтьових пластинок. Для попередження рецидивів лікування слід продовжувати не менше 1 місяця після зникнення основних симптомів захворювання.

Висновок. Препарат «Естезіфін» можна вважати ефективним засобом для монотерапії онихомікоза стоп і кистей рук. Необхідно рекомендувати «Естезіфін» широко впроваджувати при лікуванні онихомікозу в амбулаторних умовах, що призведе до клінічного лікування і поліпшенню якості життя пацієнтів.

УДК 615.282.07

ТОПИЧЕСКИЕ АНТИМИКОТИКИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА

**Р.Ф. Айзятупов, Я.А. Полях,
М.Э. Скородед, О.С. Пойманова**

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман

Существует большое количество антимикотиков местного действия, однако, несмотря на это с каждым годом отмечается существенный рост количества больных, что вызывает обоснованную озабоченность у врачей здравоохранения.

Цель работы. Проанализировать результаты лечения микотической инфекции с применением топических препаратов крем 1 % Ламикон и спрей 1 % Ламикон.

Результаты. При местной терапии микозов хорошо зарекомендовали себя крем 1 % Ламикон и спрей 1 % Ламикон. 1 % крем Ламикон (1 г крема содержит тербинафина гидрохлорида в пересчёте на 100% безводное вещество 0,01 г). Тербинафин – аллиламин с широким спектром противогрибкового действия. Угнетает ранний этап биосинтеза стерина в клеточной мембране гриба. Вызывает дефицит эргостерола, что приводит к внутриклеточному накоплению сквалена и ведет к гибели клетки гриба. Тербинафин оказывает фунгицидное действие про-

тив грибковых инфекций кожи, вызванных - *Trichophyton rubrum*, *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T.v. violaceum*, *Microsporum canis* и *Epidermophyton floccosum*. Крем 1 % Ламикон наносится тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки 2 раза в день (7-10 дней). При наружном лечении микозов широкое применение нашёл спрей 1 % Ламикон (действующее вещество тербинафина во флаконах с распылителем по 25 г). Обладает фунгицидным действием на дерматофиты, плесневые и некоторые диморфные грибы. При нанесении спрея в очагах поражения создается максимальная концентрация действующего вещества, а орошаемые участки покрываются защитной плёнкой, которая изолирует очаг микоза, хорошо удерживает антимикотик и не нарушает функции кожи и сальных желез. Спрей 1 % Ламикон применяется 1 раз в сутки (7 дней), не вызывает раздражения даже при нанесении на эритематозно-экссудативные очаги поражения.

Выводы. Крем 1 % Ламикон и спрей 1 % Ламикон - высокоэффективные препараты при лечении различных клинических форм микотической инфекции, не имеют побочных явлений, хорошо переносятся больными. В зависимости от особенностей клинических форм заболевания сроки клинического и микологического излечения наступают в течение 7-10 дней.

УДК 616.34:616.5-002.2

РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО- КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ

**Р.Ф. Айзятупов, Я.А. Полях,
М.Э. Скородед, О.С. Пойманова**

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман

Актуальность темы. Одним из наиболее часто встречающихся хронических рециди-