

УДК:616.314-089.32

©С. А. Огієнко, Я. В. Пюрик

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Хірургічне лікування хворих на генералізований пародонтит шляхом удосконалення окремих технологічних ланок операції Цішинського – Відмана – Неймана

Серед складних проблем стоматології пародонтит є одним із тяжких захворювань. Ускладнення лікування пародонтиту, такі, як оголення шийок зубів та міжзубних проміжків, зниження висоти альвеолярного краю – завдання складне і далеко не завжди здійсненне.

Метою нашого дослідження було забезпечити можливість одномоментного хірургічного втручання на пародонті однієї щелепи, попередити у післяопераційному періоді оголення шийок зубів та міжзубних проміжків, зниження висоти альвеолярного краю шляхом вдосконалення клаптевої операції Цішинського – Відмана – Неймана. 56 хворим на генералізований пародонтит (1 група) проводили запропоновану нами модифікацію операції Цішинського – Відмана – Неймана, в якій покращено ряд технологічних моментів, а новим елементом втручання є накладання в кісткові кишені й на вестибулярну поверхню

коміркового відростка суміші аутологічного кісткового мозку та колагенової губки. Хворим 2 групи (54 чол.) проводили клаптеву операцію, модифіковану В. І. Лук'яненком. Через 3 місяці після операції суттєвої різниці між станом хворих 1 і 2 груп не було. Через 6 і 9 місяців – у більшості хворих 1 групи в ділянці оперованих зубів утворилось стійке зубо-ясенне прикріплення за типом циркулярної зв'язки, при рентгенологічному контролі виявлено островки осифікації і стабілізації патологічного процесу, а в хворих 2 групи такі зміни зареєстровані меншою мірою.

Отже, запропонована модифікація операції Цішинського – Відмана – Неймана забезпечує можливість одномоментного хірургічного втручання на пародонті однієї щелепи, попереджує оголення шийок зубів, міжзубних проміжків та зниження висоти альвеолярного краю, усуває патологічні зубо-ясенні кишені.