

ЗМІСТ

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Клініко-епідеміологічна характеристика жінок фертильного віку з лейоміомою матки, мешканок промислового регіону України

В.М. Запорожан, Вл.В. Подольський 7

Порядок надання медичної допомоги жінкам із багатоплідною вагітністю

Наказ МОЗ України від 08.04.2015 р. № 205 12

ГІНЕКОЛОГІЯ

До питання комплексної терапії ендометріозу

Н.Ф. Захаренко, Н.В. Коваленко, І.П. Маноліяк 28

Профілактика рецидивів хронічного кандидозного вульвовагініта у жінчин в період ранньої постменопаузи

В.А. Бенюк, Л.Д. Ластовецкая, Е.А. Щерба 34

Опыт применения фитопрепарата Циклодинон® у пациенток с недостаточностью желтого тела и гиперпролактинемией

В.П. Сметник, Л.Б.Бутарева 42

Новини гінекології. TOP 5 48

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

Классификация, диагностика и менеджмент гипертензивных нарушений во время беременности

Пересмотренное заявление Международного общества по изучению гипертензии при беременности (ISSHP) 50

Фармакотерапия ожирения

Клиническое практическое руководство Эндокринологического общества США
Caroline M. Apovian, Louis J. Aronne, Daniel H. Bessesen и др. 59

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

Симптомна лейоміома матки великих розмірів. Чи можна зберегти матку?

Т.Ф. Татарчук, Н.В. Косей, Л.А. Васильченко, В.А. Джупін 64

ФАРМАКОТЕРАПІЯ

Европейская комиссия одобрила расширение показаний к применению препарата компании Gedeon Richter

Новости компании Gedeon Richter 70

Применение отечественного препарата гекотон при проведении спинальной анестезии

Г.А. Попадьяна, Е.М. Егрищина, А.Г. Спорыш и др. 72

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА

Проблема дефіциту вітаміну D

В.Б. Зафт, О.В. Рикова, А.А. Зафт та ін. 75

Значення результатів визначення параметрів ретикулоцитів у клінічній практиці

Л.І. Сергієнко 80

ВІД РЕДАКЦІЇ

Публикация научной статьи в журнале ГЭК Украины

Правила и условия публикации в научно-практическом журнале «Репродуктивная Эндокринология» 84



ПОЛІЖИНАКС
ПОЛІЖИНАКС ВІРГО
НЕОМІЦИН + ПОЛІМІКСИН В + НІСТАТИН

БАЛАНС МІЖ
ЕФЕКТИВНІСТЮ
та ДБАЙЛИВИМ
СТАВЛЕННЯМ
до екосистеми
піхви



уже є в аптеках



надійно та дбайливо діє при бактеріальному вагініті та кандидозі



діє на збудників найбільш поширених інфекцій



виявляє протизапальну дію без гормонів



для лікування та профілактики післяопераційних та післяпологових ускладнень

Представництво в Україні:

Київ 01001, вул. Мала Житомирська, 6
Тел.: (044) 278 06 38, innotech@innotech.com.ua

Склад: 1 капсула вагінальна містить неоміцину сульфат 35 000 МД, поліміксин В сульфат 35 000 МД, ністатин 100 000 МД, Фармакопратейтична група. Протимікробні та антисептичні засоби для застосування у гінекології. Антибіотики. Ністатин. Комбінація. Код АТХ G01A A51.

Показання. Лікування вагітну, стригненого чутливого до препарату мікроорганізмів, у тому числі:

- бактеріальний вагініт, стригненого чутливого до препарату мікроорганізмів;
- рецидивуючий неспецифічний вагініт;
- вагініт, стригненого грибами роду Candida (Candida albicans і Candida non-albicans);
- вагініт, стригненого омнівалом інфекцій.

З метою профілактики інфекційних ускладнень Поліжинакс рекомендується застосовувати перед початком будь-якого хірургічного втручання на статевих органах, перед аборт, встановленням внутрішньоматкового засобу, перед і після довготривалої шийки матки, перед проведенням внутрішньоматкових та внутрішньоруртальних обстежень, перед пологами.

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента (комбінації компонентів) препарату. Через наявність олії соєвої Поліжинакс протипоказаний пацієнтам з алергією до сої та арахісу.

Застосування у період вагітності або годування груддю. У клінічних дослідженнях Поліжинаксу на даній час не було відзначено та не досліджено про впливу вживання ва розвою або дітоксичності. Спосіб застосування за вагітністю, що зазнала впливу цього лікарського засобу, недостатньо, щоб виключити будь-який ризик. Тому застосування препарату у період вагітності можливе лише за призначенням лікаря у тих випадках, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.

Через відсутність даних щодо проникнення препарату у грудне молоко застосування цього препарату слід уникати у період годування груддю.

Спеціалізоване застосування та дози. Дорослим застосовувати інтравагінально ввечері перед сном 1 капсулу на добу. Курс лікування – 12 днів, профілактичний курс – 6 днів. Не слід парувати курс лікування під час менструації.

Категорія відпуску. За рецептом.

Виробник. Іннотера Шуазі, Франція/Innothera Chouzy, France.

Юнорм®

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРОТИВОРВОТНОЕ СРЕДСТВО



ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ 8 МГ:

- противорвотная в/в инфузия однократно;
- исключает ошибку медицинского персонала.



ЛИДЕР РЫНКА
инфузионных
препаратов
Украины



ЮРИЯ·ФАРМ

www.uf.ua

Информация про рецептурное лекарственное средство для профессиональной деятельности специалистов в отрасли здравоохранения. РС № UA/13974/01/01, РС № UA/14069/01/01.
Фармакотерапевтическая группа: противорвотное средство, что устраняет тошноту. Антагонисты рецепторов серотонина (5HT₃). Код АТС А04А А01. **Состав. Действующее вещество:** ондансетрон; 1 мл раствора содержит ондансетрона гидрохлорида дигидрата в пересчете на ондансетрон 2 мг; 5 мл сиропа содержат ондансетрона гидрохлорида дигидрата в пересчете на ондансетрон 4 мг. **Показания:** тошнота и рвота, вызванные цитотоксической химиотерапией и лучевой терапией. Профилактика и лечение послеоперационной тошноты и рвоты. **Противопоказания:** гиперчувствительность к компонентам препарата. Применение ондансетрона вместе с апоморфина гидрохлоридом противопоказано, поскольку наблюдались случаи сильной артериальной гипотензии и потери сознания во время совместного применения. **Побочные реакции:** головная боль; судороги, двигательные нарушения; головокружение во время быстрого введения препарата, преходящие зрительные расстройства; аритмии, удлинение интервала QT, ощущение тепла или приливов; гипотензия, икота, запор, местные реакции в области введения, анафилактические реакции, парестезии, повышение температуры тела, боль, покраснение, жжение в месте введения, гипокалиемия. Полный перечень показаний, противопоказаний, побочных эффектов, а также подробную информацию про способ и особенности применения препарата можно найти в инструкции для медицинского применения препарата (Юнорм® от 17.10.14 № 130, Юнорм® сироп от 20.11.14 №873). Перед применением и/или назначением обязательно внимательно прочитайте эту инструкцию. **Способ использования и дозы:** тошнота и рвота, которые вызваны химиотерапией и лучевой терапией. Эметогенный потенциал терапии рака варьирует в зависимости от дозы и комбинации режимов химиотерапии и лучевой терапии. Внутривенное или внутримышечное введение непосредственно перед началом лечения. Для профилактики отсроченной или длительной рвоты рекомендовано пероральное или ректальное применение препарата. **Производитель:** ООО «Юрия-Фарм», 18030, г. Черкассы, ул. Вербовецкого, 108. Тел. +38(044) 281-01-01. За дополнительной информацией про препарат обращайтесь по адресу: ООО «Юрия-Фарм», г. Киев, ул. Н. Амосова, 10. Тел. +38(044) 281-01-01. www.uf.ua

CONTENTS

HEALTH CARE

Clinical and epidemiological characteristics of fertile aged women with uterine leiomyoma, residents of industrial region of Ukraine V.M. Zaporozhan, V.I.V. Podolskyi	7
The procedure for providing medical care for women with multiple pregnancy Order of the Ministry of Health of Ukraine of 08.04.2015 No 205	12

GYNECOLOGY

To the question of complex treatment of endometriosis N.F. Zakharenko, V.N. Kovalenko, I.P. Manoliak	28
Prophylaxis of recedives of chronic recurrent vulvovaginal candidiasis in women in the early postmenopausal period V.O. Beniuk, L.D. Lastovetska, O.A. Shcherba	34
Experience the use of phytopreparations Cyclodynon® in patients with insufficiency of corpus luteum and hyperprolactinemia V.P. Smetnik, L.B. Butareva	42
TOP 5. Gynecology	48

INTERDISCIPLINARY PROBLEMS

The classification, diagnosis and management of the hypertensive disorders of pregnancy A revised statement from the ISSHP	50
Pharmacological management of obesity An Endocrine society clinical practice guideline Caroline M. Apovian, Louis J. Aronne, Daniel H. Bessesen et al	59

CLINICAL CASE

Large size symptomatic uterine leiomyoma. Is saving the uterus feasible? T.F. Tatarchuk, N.V. Kosei, L.A. Vasylychenko, V.A. Dzhupin	64
--	----

PHARMACOTHERAPY

European Commission approves the expansion of indications for use of the drug from Gedeon Richter company News of Gedeon Richter company	70
National drug gekoton use during spinal anesthesia G.A. Popadina, E.M. Egryshchyna, A.D. Sporysh et al	72

LABORATORY DIAGNOSTICS

Problem of vitamin D deficiency V.B. Zaft, O.V. Rykova, A.A. Zaft et al	75
The importance of results of determining the reticulocytes parameters in clinical practice L.I. Sergienko	80

НОРМОЦИКЛ – ЦИКЛ В НОРМІ!

ПОКАЗАННЯ:
Порушення регулярності
менструального циклу
Естрогензалежні захворювання
Ановуляторний цикл

НОРМОЦИКЛ



НОРМОМЕНС

ПОКАЗАННЯ:

Передменструальний синдром
Дисменорея
Масталгія, мастодія
(в т.ч. при мастопатії)

НОРМОМЕНС - БАЛАНС
ГОРМОНІВ ТА НАСТРОЮ!

Organosyn

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ І ФАМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Висновок ДСЄЕ НОРМОМЕНС № 05.03.02-03/95824 від 10/22/2013; НОРМОЦИКЛ № 05.03.02-03/95825 від 22/10/2013. Не є лікарським засобом.
вул. Спаського, 8, м. Київ, 04112, Україна, тел./факс: +38 (044) 456 99 33 e-mail: synmedic@synmedic.com.ua, www.synmedic.com.ua