

# Сімейна медицина

ISSN 2307-5112

№1 '2017 (69)

ЖУРНАЛ ВИХОДИТЬ  
3 ВЕРЕСНЯ 1999 РОКУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

**ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ:  
СУЧАСНІ ПІДХОДИ  
ДО ДІАГНОСТИКИ  
ТА ВЕДЕННЯ ХВОРИХ  
ІЗ ПСЕВДОПОДАГРОЮ**

8

**КОГНІТИВНІ ПОРУШЕННЯ  
У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО  
ЛІКАРЯ**

21

**ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ  
КЛІТИННОГО ТА ГУМОРАЛЬНОГО  
ІМУНІТЕТУ В ДИНАМІЦІ  
ЛІКУВАННЯ ПНЕВМОНІЇ  
У ХВОРИХ НА ТЛІ ГОСТРИХ  
ЛІМФОБЛАСНИХ ЛЕЙКОЗІВ**

26

**ПРОБЛЕМА ВІЛ/СНІДУ  
У ДІТЕЙ**

33

**ГОСТРИЙ РИНОСИНУЇТ**

90

**ТРОМБОЦИТОЗ –  
ДИФЕРЕНЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНА  
ПРОБЛЕМА У КЛІНІЧНІЙ  
ПРАКТИЦІ**

115

**КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ  
ВІТРЯНОЇ ВІСПИ**

145

## ЛЕВОЛЕТ

ЛЕВОФЛОКСАЦИН 500 мг №10

### ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР



ПНЕВМОНИЯ



ОБОСТРЕНИЕ  
ХРОНИЧЕСКОГО  
БРОНХИТА



ОСТРЫЙ  
СИНУСИТ



ПИЕЛОНЕФРИТ



Dr.Reddy's

Выдержка из инструкции к  
медицинскому применению  
препарата Леволет

**Состав:** действующее вещество:  
левофлоксацин. 3 таблетки, содержит  
левофлоксацин 500 мг в виде  
левофлоксацина гезицидната.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антибактериальные средства группы  
хинолонов. Фторхинолоны.  
Код АТХ J01M A12.

**Показания.**

- Пневмония.
- Обострение хронического бронхита.
- Острый синусит.
- Хронический бактериальный простатит.
- Осложненные и неосложненные инфекции мочевыводящих путей (в том числе пиелонефрит).
- Инфекция кожи и мягких тканей.

**Противопоказания.** Повышенная чувствительность к левофлоксацину, другим хинолонам или любому другому компоненту препарата; эпилепсия; судороги; желтуха на побочные реакции со стороны суставов после предыдущего применения хинолонов.

**Применение в период беременности или кормления грудью.** Из-за отсутствия исследований и возможности повреждения хрящевых тканей сустава растущего организма, левофлоксацин нельзя назначать беременным и кормящим, которые кормят грудью. Если во время лечения левофлоксацином наступила беременность, об этом следует сообщить врачу.

**Дети.** Дети нельзя применять левофлоксацин из-за возможного повреждения сустава сустава.

**Побочные реакции.** Микозы (включая *Candida* и протиферацию других резистентных микроорганизмов), зуд и покраснение кожи, общие реакции повышенной чувствительности (анафилактические и анафилактикоидные) с такими признаками как крапивница, сыпь бронхов и, возможно, тяжелая сыпь, а также отек кожи и слизистых оболочек (например, кожа лица и слизистой оболочки полости), анафилактическое шоковое состояние, головная боль, головокружение, повышение АД, инверсия, повышенная чувствительность к солнечному и ультрафиолетовому излучению, высыпания на коже и слизистых оболочках, тахикардия, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), эксфолиативная мультиформная эритема, тошнота, диарея, вздутие живота, запоры, стоматит, отсутствие аппетита, рвота, боль в животе, расстройство пищеварения, панкреатит, диспепсия, спазмы кишечника, которая иногда может быть признаком воспаления кишечника, в том числе псевдомембранозного колита и др.

**Упаковка.** По 10 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.

**Категория отпуска.** По рецепту.

Информация о лекарственном средстве, предназначенная для медицинских и фармацевтических работников. Перед назначением проконсультируйтесь с полным текстом инструкции к медицинскому применению. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: ООО «Др. Редди's Лабораторис», Столичний шосе, 101, оф. 11-А, г. Київ, Україна, 01131, тел. +380440791197

LEV-27.01.2016.R2